مقاله پژوهشی

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دوره ششم، شماره سوم، پاییز ۱۳۸۶، ۲۰۱–۲۰۱

ارزش تشخیصی آسپیراسیون با سوزن نازک در تودههای قابل لمس پستان

دكتر فرشته كماني ، دكتر محمود حسين زاده ملكي ، دكتر فرزانه رحيمي ، مهندس ناصر ولايي ؛

پذیرش مقاله: ۸٦/٤/۲٥

دریافت اصلاحیه از نویسنده: ۸٦/٣/٣١

ارسال مقاله به نویسنده جهت اصلاح: ۸٦/١/٢٥

يافت مقاله: 80/9/22

چکیده

زمینه و هدف: نظر به شیوع تودههای قابل لمس پستان و عوارض شناخته شده تشخیص دیر هنگام و گزارشات متفاوتی که از قدرت Fine Needle Aspiration) نسبت به روش استاندارد و پاتولوژی بیوپسی باز وجود دارد، به منظور تعیین قدرت FNA نسبت به پاتولوژی در تشخیص تودههای قابل لمس پستان، این تحقیق انجام شد.

مواد و روشها: تحقیق به روش بررسی آزمون تشخیصی انجام گرفت. ۷۵ بیمار مراجعه کننده به بیمارستان آیت ا... طالقانی با شکایت توده پستان قابل لمس در سالهای ۱۳۸۳–۱۳۸۲، تحت بررسی قرار گرفتند. بعد از تمیز کردن پوست با الکل و گرفتن توده بین انگشت شست و سبابه با سرسوزن شماره ۲۵–۲۲ و سرنگ ۱۰ سیسی وارد توده شده و ساکشن ممتد با ۴ تا ۵ بار تغییر محل سوزن در توده صورت می گرفت. سپس ساکشن قطع شده ، نمونه به دست آمده روی لام پاشیده شده و پس از فیکس کردن با الکل ۹۶٪ به بخش پاتولوژی ارسال می گردید. در صورتی که توده کیستیک بود و به صورت کامل تخلیه می گردید از مطالعه حذف می شد. ۴۸۸ توسط سیتوپاتولوژیست بر اساس آخرین تقسیم بندی سیتوپاتولوژی تودههای پستان به گروه ۱۲ نمونه ناکافی، ۲۲ نمونه خوش خیم، ۳۵ نمونه به خواب پاتولوژی بیوپسی باز (استاندارد طلایی) میزان تقسیم بندی می شد (۲۴ و ۲۳ گروه indeterminate). سپس با توجه به جواب پاتولوژی بیوپسی باز (استاندارد طلایی) میزان حساسیت، ویژگی، ارزش پیش بینی مثبت و منفی و کارآیی کلی FNA در تشخیص بدخیمی تودههای قابل لمس پستان تعیین می گردید.

یافتهها: میانگین سن بیماران $+1\pm 1$ سال با حداقل سن +1 سال و حداکثر سن +1 سال بود. +1 مورد به علت کیستیک بودن توده از مطالعه خارج شدند، در +1 مورد (+1 مو

نتیجه گیری: به نظر میرسد FNA یک روش مناسب بررسی تشخیص بدخیمی توده قابل لمس پستان باشد و لذا بکارگیری آن توصیه میشود.

واژههای کلیدی: FNA، توده قابل لمس پستان، سیتوپاتولوژی

مقدمه

بیماریهای پستان از شایع ترین علل مراجعه به پزشکان می باشد به طوری که از هر دو خانم یک نفر به علت بیماری

پستان در طول زندگی به پزشک مراجعه می کند. اکثر بیماریهای پستان خوشخیم هستند (۸۰-۹۰٪). روشهای تشخیص بافتی در تودههای قابل لمس پستان شامل FNA،

۱- استادیار گروه آموزشی جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲- (نویسنده مسؤول) استادیار گروه آموزشی جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

تلفن: ۳۹۱-۸۲۲۰۰۱، فاکس: ۳۹۱-۸۲۲۰۲۲، یست الکترونیکی: ۳۹۸-۸۲۲۰۲۲، فاکس: ۳۹۸-۸۲۲۰۰۲۲، یست

۳- استاد گروه آموزشی پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۴- عضو هیأت علمی گروه آموزشی اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

core needle open incisional و excisional بيوپسى مىباشد [۱]. FNA بتدریج به یک روش روتین در تشخیص تـودههـای يستان تبديل مىشود.

این روش قادر به افتراق تودههای cystic از solid میباشد ولی باید توجه داشت که انجام آن قبل از ماموگرافی سبب ایجاد هماتوم کوچک و اختلال در تفسیر نتایج ماموگرافی می گردد. با استفاده روتین از این روش تشخیصی در بسیاری موارد از بیوپسیهای غیرضروری میتوان اجتناب نمود [۲].

این روش اولین بار توسط ELLIS & MARTIN به کار گرفته شده و در سال ۱۹۳۰ گزارش گردید [۳]. این روش بـه صورت فزایندهای جایگزین OPEN BIOPSY در تشخیص تودههای قابل لمس پستان می شود [۱]. در اکثر مطالعات میزان مثبت کاذب در تشخیص بدخیمی به وسیله FNA، ۱ تا ۲٪ است [۱-۴]. FNA بیوپسی یک روش با تهاجم کم و هزینه ناچیز است ولی با میزان منفی کاذب بالای در مقایسه با OPEN BIOPSY همراه است به طوری که در یک گـزارش ارزش پیشبینی منفی آن ۸۶٪ [۳] و گـزارش دیگـری ۹۱٪ [۴] اعلام شده است. حساسیت این روش در گزارش ۹۱/۷. [۶] بوده است. از نظر به دست نیاوردن نمونههای کافی توسط FNA در مطالعهای ۲۸٪ [۴] و در مطالعه دیگری ۱۱/۹٪ [۹] گزارش شده است. با توجه به تحقیقات در پیشینه تحقیق و جایگزینی پیشرونده FNA به جای بیوپسی باز در تشخیص تودههای قابل لمس پستان و به منظور تعیین قدرت FNA نسبت به پاتولوژی در تشخیص تودههای قابل لمس پستان، این تحقیق روی افراد مراجعه کننده با شکایت توده قابل لمس پستان در بیمارستان آیت ا... طالقانی تهران از فروردین ماه ۸۲ لغایت دی ماه ۸۳ انجام گرفت.

مواد و روشها

نوع مطالعه اعتبارسنجی آزمونهای تشخیصی است. جمعیت مورد مطالعه کلیه بیمار انی هستند که به علت توده پستانی قابل لمس به بیمارستان طالقانی مراجعه نمودهاند. روش نمونه گیری به صورت غیر احتمالی متوالی بوده است. نمونه مورد بررسی شامل ۷۵ بیمار بود که با شکایت توده يستاني قابل لمس به بيمارستان طالقاني مراجعه نموده و قبل


از انجام بیوپسی باز تحت آسپیراسیون با سوزن نازک قـرار گرفتند. باتوجه به حساسیت ۹۰٪ و دقت ۰/۰۷ حدود اطمینان ۹۵٪ حجم نمونه ۷۱ نفر تخمین زده شد. آن دسته از بیمارانی که با این روش تشخیص کیست پستان در آنها محرز می شد و توده کاملا محو می شد از مطالعه خارج می شدند. بعد از تمیز کردن پوست با الکل و گرفتن ضایعه بین انگشت شست و سبابه، سوزن وارد ضایعه شده و آسپیرسیون انجام می شد و در حالی که نوک سوزن داخل ضایعه مختصری جابجا میشد، ۴ تا ۵ بار آسپیره می گردید و سپس آسپیراسیون قطع شده و سوزن خارج می گشت محتویات سرنگ روی ۲ تا ۴ لام تخلیه شده و پس از فیکس کردن با الكل ۹۶ درجه همراه با فرم شماره ۱ به بخش پاتولوژي ارسال می گردید. لامهای تهیه شده از FNA توسط پاتولوژیست بر اساس آخرین طبقهبندی سیتوپاتولوژی پستان به صورت ذیل گزارش میشد: C۱ نمونه ناکافی- C۲ خوشخیم- C۳ به نفع خوش خیم - ۲۴ به نفع بدخیم - ۲۵ بدخیم و در فرم اطلاعاتی شماره ۱ ثبت می گردید.

ضمناً تمام بیماران تحت عمل جراحی بیوپسی باز قرار می گرفتند و نتایج پاتولوژیک نمونه بیوپسی باز در فرم شماره ۲ ثبت می گردید. دادههای فرمهای اطلاعاتی ۱و۲ طبقهبندی و استخراج شده و میزان حساسیت، ویژگی، ارزش پیشبینی مثبت و منفی آن نسبت به استاندارد پاتولوژی تعیین گردید.

نتايج

در طول مدت بررسی ۷۵ بیمار با توده پستان قابل لمس به بیمارستان آیت ا... طالقانی مراجعه نمودند که بیماران در سنین ۱۰±۴۴ سال بوده حداقل ۲۰ سال تا حداکثر ۷۵ سال سن داشتند. اندازه توده در بررسی بالینی ۶/۸±۳/۲ سانتی متر و از حداقل ۱ تا حداکثر ۳۵ سانتی متر بود. در ۴ مورد (۵/۳) از کل بیماران توده پستان کیستیک بود که با آسپیراسیون كاملاً تخليه شد و از مطالعه خارج گرديد. در ۱۱ مورد (۱۴/۷٪) از کل بیماران FNA به عمل آمده سلول کافی جهت بررسی پاتولوژیک به دست نیامه (C۱) و در نتیجه تحقیق روی تعداد ۶۰ بیمار انجام گرفت. نتیجـه سـیتوپاتولوژی افـراد مورد بررسی در نمودار ۱ ارایه گردیده و نشان می دهد که

شایع ترین جواب سیتوپاتولوژی CT به تعداد CT مورد (۴۳/۳٪) و بعد CA به تعداد CA مورد CA به تعداد CA مورد CA", بود.



نمودار ۱- توزیع ۲۱ توده پستان برحسب سیتوپاتولوژی بیماری C۱ نمونه ناکافی C۲، خوشخیم C۰۰، شواهدی دال بر بدخیمی ندارد، C2 شواهد مشکوک به بدخیمی دارد، C۰ بدخیم

نتیجه بیوپسی باز ۲۷ مورد (۴۵٪) بدخیم و ۳۳ مورد (۵۵٪) خوشخیم بوده است. ۹ مورد سیتوپاتولوژی FNA که C۳ و ۲۸ گزارش شده در گروه indeterminate قرار گرفته است. توزیع نمونههای مورد بررسی بر حسب تشخیص بدخیمی و به تفکیک روشها در جدول ۱ ارایه شده است و نشان میدهد که میزان حساسیت، اختصاصیت، ارزش پیشبینی منفی و کارایی کلی FNA در تشخیص توده بدخیم پستان ۱۰۰٪ بوده است.

ضمناً از ۷ گزارش سیتوپاتولوژی ۲۳ (به نفع خوش خیم) در پاتولوژی بیوپسی باز همه موارد خوش خیم گزارش شده و ۲ مورد که در سیتوپاتولوژی ۲۴ (به نفع بدخیمی) گزارش شده است در پاتولوژی بیوپسی باز بدخیم بوده است. یا به تعبیر دیگر مواردی از FNA که در گروه indeterminate قرار گرفته نیز با پاتولوژی هماهنگ بوده است.

جدول ۱- توزیع نمونهها بر حسب تشخیص توده قابل لمس پستان به تفکیک روشهای تشخیص

نتايج FNA	نتايج پاتولوژی			
	مثبت	منفى	کل	
مثبت (تعداد)	۲۵	•	۲۵	
منفی (تعداد)	•	78	78	
کل (تعداد)	۲۵	78	۵۱	

بحث

تحقیق نیشان داده که میرزان حساسیت، ویژگی، ارزش پیشبینی منفی، ارزش پیشبینی مثبت و کارایی کلی FNA پیشبینی مثبت و کارایی کلی FNA در تشخیص توده پستان قابل لمس همگی ۱۰۰٪ است. در تحقیق Reshma ariga و همکاران که روی ۲۳۱ بیمار زیر سن ۴۰ سال با توده قابل لمس پستان صورت گرفته است FNA حساسیت، ویژگی، ارزش پیشبینی منفی و ارزش پیشبینی مثبت ۹۹٪ داشته است [۳]. که تأیید کننده نتایج به دست مثبت ۹۹٪ داشته است [۳]. که تأیید کننده نتایج به دست همکاران روی ۳۵۱ بیمار با توده پستان قابل لمس، ۴۸۸ ارزش پیشبینی مثبت ۹۸٪ و ارزش پیشبینی منفی ۱۹٪ داشته است [۴]. در تحقیق John Vetto و همکاران روی ۴۶٪ داشته است [۴]. در تحقیق FNA ارزش پیشبینی منفی و حساسیت ۹۵٪ داشته است [۵].

در تحقیق Kang Np و Jung SH که روی ۱۰۶ بیمار با توده قابل لمس پستان به عمل آمده، FNA حساسیت ۹۱/۷٪، ویژگی ۹۶/۹٪ و کارایی ۹۳/۵٪ داشته است [۶]. در تحقیق Wollberg WH و همكاران روى ۴۶۴ بيمار با توده قابل لمس پستان، FNA حساسیت ۹۸٪، ویژگی ۹۴٪ و ارزش پیشبینی مثبــت ۹۲٪ داشــته اســت [۷] و در تحقيــق Wollberg و همکاران که روی ۵۶۹ بیمار با توده قابل لمس پستان، صورت گرفته است، FNA ارزش پیشبینی مثبت ۹۷٪، و کارایی کلی ۱۰۰٪ داشته است [۸] و بالاخره در تحقیـق Kanchanabat و همکاران روی ۶۰ بیمار با توده قابل لمس پستان، FNA ارزش پیشبینی مثبت ۱۰۰٪ داشته است [۹]. یافتههای مطالعات مختلف تقريباً با يافته هاى مطالعه حاضر مشابهت داشته و نشان می دهد FNA در تودههای قابل لمس پستان در صورتی که با روش صحیح و با حضور سیتوپاتولوژیست ماهر انجام شود روش قابل قبولی میباشد. علت این که انجام FNA در تودههای قابل لمس پستان در ایران چندان رایج نـشده اسـت شاید عدم مهارت کافی فرد نمونه گیر، عدم دسترسی به سیتوپاتولوژیست با تجربه و وجود درصد بالای نمونه ناکافی در FNAهای به عمل آمده باشد.

تودههای قابل لمس پستان توانستهاند میـزان FNA بـا نمونـه ناکافی را به ۲۰٪ برسانند. کتاب ۲۰۰۳ Winiferd gray ناکافی کمتـر از ۲۵٪ را قابل قبول دانسته است [۱۳].

نتيجهگيري

در این مطالعه میزان FNA با نمونه ناکافی ۱۴/۷٪ بوده است که احتمالاً علت آن به کارگیری سرنگ مناسب، تهیه ۲- FNA با افــزایش تجربــه نمونــهگیــری و بهــرهگیــری از سیتوپاتولوژی بیت بــا تجربــه مــیباشــد. در مطالعــه حاضـر سیتوپاتولوژی (۲۳–۲۳) indeterminate با پاتولوژی بیوپسی باز هماهنگی کامل داشت ولــی توصـیه مــیشـود افـرادی کـه FNA بــا جــواب indeterminate دارنــد حتمـاً کاندیــد انجـام بیوپسی باز شوند. در یک جمعبندی به نظر میرسد که FNA بیوپسی باز شوند. در یک جمعبندی به نظر میرسد که FNA بیروپسی باز شوند. در یک جمعبندی به نظر میرسد که بیروپسی توده قابل لمس پستان است.

در تحقیق Rashma ariga و همکاران که روی ۹۲۳ بیمار با توده قابل لمس پستان در سن بالای ۴۰ سال انجام شد، FNA حساسیت ۹۸٪، ویژگی ۹۷٪ ارزش پیشبینی مثبت ۸۶٪ و ارزش پیشبینی منفی ۹۹٪ داشته است [۳].

مطالعه حاضر نشان داد که در ۱۴/۷٪ از FNAهای به عمل آمده نمونه ناکافی بوده است. در پیشینه تحقیق نیز مطالعه Andrew saxe و همکاران که روی ۳۵۱ بیمار صورت گرفت، ۲۸٪ [۴] FNAها نمونه ناکافی داشتند. در تحقیق Kanchanabat و همکاران که روی ۶۰ بیمار به عمل آمد در کارا آباد FNA[۹] نمونه ناکافی داشت. در تحقیقات به طور کلی علل نا کافی بودن نمونه را در FNA شامل موارد ذیل دانستهاند: عدم تجربه فرد نمونه گیر، (۱-۴-۱۰) کوچک بودن سایز توده قابل لمس پستان، [۱،۱۱] استفاده از سرنگ نامناسب [۲۱-۱۱،۲] و تهیه تعداد ۲ تا ۴۸۸۴ از توده. در یک تحقیق با آموزش نمونه گیری تهیه ۲۸۸۴ در FNA در FNA ۴-۲ در تحقیق با آموزش نمونه گیری تهیه ۲۰۸۸ در جمقیق با آموزش نمونه گیری تهیه ۲۰۸۸ در FNA ۴-۲

References

- [1] Souba WW, Fink MP, Jurkovich GJ, Kaiser LR, Pearce WH, Pemberton JH. ACS Surgery principle& practice. WebMD Inc. 2004; pp: 125-90.
- [2] Townsend CM, Beauchamp RD, Evers BM, Mattox KL. Sabiston textbook of surgery the biological basis of modern surgical practice 17th ed. Elsevier-Sunders. 2004; pp: 876-7.
- [3] Ariga R, Bloom K, Reddy VB, Kluskens L, Francescatti D, Dowlat K, et al. Fine-needle aspiration of clinically suspicious palpable breast masses with histopathologic correlation. Am J Surg, 2002; 184(5): 410-3.
- [4] Saxe A, Phillips E, Orfanou P, Husain M. Role of sample adequacy in fine needle aspiration biopsy of palpable breast lesions. *Am J Surg*, 2001; 182(4): 369-71.
- [5] Vetto J, Pommier R, Schmidt W, Wachtel M, DuBois P, Jones M, et al. Use of the "triple test" for palpable breast lesions yields high diagnostic accuracy and cost savings. Am J Surg, 1995; 169(5): 519-22.
- [6] Jung SH, Kang NP. The diagnostic value of fine needle aspiration cytology of the breast mass. J Korean Breast Cancer Soc, 1998; 1(2): 170-6.

- [7] Wolberg WH, Tanner MA, Loh WY. Fine-needle aspiration for breast mass diagnosis. *Arch Surg*, 1989; 24(7): 814-8.
- [8] Wolberg WH, Street WN, Heisey DM, Mangasarian OL. Computerized breast cancer diagnosis and prognosis from fine- needle aspiration. Arch Surg, 1995; 130(5): 511-6.
- [9] Kanchanabat B, Kanchanapitak P, Thanapongsathorn W, Manomaiphiboon A. Fine-needle aspiration cytology for diagnosis and management of palpable breast mass. Aust N Z J Surg, 2000; 70(11): 791-4.
- [10] Brunicardii FC, Andersen KD, Billiar TR, Dunn DL, Hunter JG, Pollock RE. Schwartzs Principles of Surgery 8th ed. McGraw-Hill companies, Inc. 2005; p: 477.
- [11] Susan J, Pacinda Ibrahim R. Fine needle aspiration of the breast masses. *J Adolesent Health*, 1998; 23: 3-6.
- [12] Wu M, Burstein DE. Fine needle aspiration. Cancer Invest, 2004; 22(4): 620-8.
- [13] Winiferd G. Diagnostic cytopathology Winiferd gray second edition cherchill living stone. 2003; pp. 248-50.