

مقاله پژوهشی

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دوره ششم، شماره دوم، تابستان ۱۳۸۶، ۱۳۴-۱۲۹

فراوانی مصرف قطره آهن کمکی و موانع مصرف آن در کودکان ۶-۲۴ ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر رفسنجان در سال ۱۳۸۲

دکتر ناهید مسعودپور^۱، زینت سالم^۲، دکتر سیدمهدی سیدمیرزایی^۳، احمدرضا صیادی^۴، سکینه ابراهیمی پور^۵

دریافت مقاله: ۸۵/۴/۱۰ ارسال مقاله به نویسنده جهت اصلاح: ۸۵/۹/۱۵ دریافت اصلاحیه از نویسنده: ۸۶/۵/۱۴ پذیرش مقاله: ۸۶/۶/۲۶

چکیده

زمینه و هدف: کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن، یکی از مشکلات عمده بهداشت عمومی در دنیاست و کودکان زیر ۲ سال از مهم‌ترین گروه‌های آسیب پذیر می‌باشند. تجویز آهن کمکی به شیرخوار یکی از روش‌های پیشگیری از فقر آهن است که در حال حاضر توسط مراکز بهداشتی کشور اجرا می‌شود. ولی با وجود ضرورت مصرف آهن، تعدادی از مادران علی‌رغم در دسترس بودن قطره آهن در تمام مراکز بهداشتی، به دلایلی منطقی یا غیرمنطقی از خوردن قطره آهن به شیرخوار خود امتناع می‌ورزند. هدف از انجام این طرح، تعیین فراوانی مصرف قطره آهن کمکی و شناخت موانع مصرف آن می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، ۱۲۰۰ شیرخوار ۶-۲۴ ماهه تحت پوشش هفت مرکز بهداشتی شهر رفسنجان در سال ۱۳۸۲ به طور تصادفی طبقه‌بندی شده انتخاب شدند. بعد از جلب رضایت مادر، پرسش‌نامه‌ای که شامل اطلاعات دموگرافیک کودک، مادر و چگونگی مصرف قطره آهن بود تکمیل شد و در صورت مصرف نامنظم، موانع مهم آن توسط مادران ارایه گردید.

یافته‌ها: از کل ۱۲۰۰ شیرخوار مورد مطالعه، ۶۱/۷٪ به طور منظم قطره آهن دریافت می‌کردند (۶۴-۵۸٪ CI=۰/۹۵). شایع‌ترین دلیل مصرف نامنظم آهن، سیاه شدن دندان‌ها (۲۵/۱٪) و کم‌ترین علت، سیاه شدن مدفوع (۱/۵٪) بوده است. ارتباط معنی‌داری بین مصرف نامنظم قطره آهن با سن شیرخوار، رتبه تولد، سطح تحصیلات مادر، شغل و سن مادر مشاهده شد ولی با جنس شیرخوار ارتباط معنی‌دار دیده نشد.

نتیجه‌گیری: با توجه به میزان بالای مصرف نامنظم قطره آهن و دلایل غیرمنطقی آن، آموزش بیشتر مادران و یا غنی‌سازی غذاهای شیرخوار با آهن پیشنهاد می‌شود. شیرخوارانی که قطره آهن را به صورت نامنظم دریافت می‌کنند بایستی از نظر کم‌خونی فقر آهن ارزیابی و درمان شوند.

واژه‌های کلیدی: آهن تکمیلی، کم‌خونی فقر آهن، کودکان

۱- (نویسنده مسؤل) استادیار گروه آموزشی اطفال، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

تلفن: ۰۳۹۱-۸۲۲۰۰۱۱، فاکس: ۰۳۹۱-۸۲۲۰۰۲۲، پست الکترونیکی: dr_masoodpour@yahoo.com

۲- مربی و عضو هیأت علمی گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

۳- استادیار گروه آموزشی داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

۴- مربی و عضو هیأت علمی گروه آموزشی روانشناسی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

۵- پزشک عمومی، پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مقدمه

کمبود آهن به عنوان یک مشکل بهداشتی در جهان مطرح است. در سال ۲۰۰۲ سازمان بهداشت جهانی این معضل را به عنوان هفتمین و مهم‌ترین خطر قابل پیشگیری در بروز بیماری‌ها و مرگ، رتبه‌بندی کرد [۱]. تقریباً ۲ میلیارد نفر در جهان دچار کمبود آهن هستند [۱]. شیوع آن در کشورهای در حال توسعه ۳-۴ برابر کشورهای توسعه یافته است. در این کشورها شیوع آن کمتر و در حد ۸-۲٪ گزارش شده است [۲-۳]. از گروه‌های آسیب‌پذیر برای کمبود آهن، کودکان زیر ۲ سال و زنان در سنین باروری می‌باشند [۴]. در شیرخواران فول ترم، احتیاج آهن به طور قابل توجهی بعد از سنین ۴-۶ ماهگی افزایش می‌یابد و مقدار مورد نیاز آن حدود ۰/۷-۰/۹ میلی گرم روزانه برآورد می‌شود، این نیاز به ویژه در ارتباط با وزن بدن و دریافت انرژی خیلی بالاست. در بدن نوزاد فول ترم، ۲۵۰-۳۰۰ میلی گرم آهن وجود دارد و در پایان یک سالگی، آهن بدن کودک دو برابر می‌شود. بنابراین تغییر شدید در میزان آهن در فاصله سنی ۱۲-۶ ماهگی و یک تا دو سالگی روی می‌دهد در این سنین، نیاز به آهن در ارتباط با انرژی دریافتی زیاد می‌باشد، به عبارتی در یک کودک ۱۲-۶ ماهه، ۱/۵ میلی گرم آهن به ازای هر ۱۰۰۰ کیلوکالری انرژی باید جذب شود. در مراحل از شیرگیری، که ذخیره آهن جنینی رو به اتمام گذاشته، کودک برای رفع نیاز خود، به آهن دریافتی رژیم متکی خواهد بود، بنابراین غذاهایی که حاوی مقدار کافی گوشت و اسید اسکوربیک هستند ممکن است بتوانند تا حدی این نیاز را بر طرف نمایند. در کشورهای توسعه یافته، غلات غنی شده با آهن و اسید اسکوربیک، هم چنین سایر غذاهای صنعتی غنی شده با این دو ریز مغذی همراه با مصرف غذاهای حاوی گوشت و ماهی می‌توانند نیاز کودکان را به آهن، در زمان رشد و تکامل سریع مغز، تأمین نمایند [۴] در حالی که در اکثر کشورهای در حال توسعه، فرآیند غنی‌سازی غذاها با آهن و ویتامین C هنوز شروع نشده است [۵]. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کم خونی فقر آهن هر چند به صورت کمی محاسبه نشده‌اند اما ائتلاف منابع

آموزشی، مراقبت‌های بهداشتی، کاهش بهره‌وری در اثر ابتلاء به بیماری‌ها در مادران و کودکان و بالاخره کاهش ظرفیت جسمی و فکری در جامعه، از نتایج قابل توجه کمبود آهن است [۶]. با توجه به اهمیت این ریز مغذی در رشد و تکامل جسمی و مغزی، یکی از راهکارهای اساسی در پیشگیری از کم خونی، غنی‌سازی مواد غذایی با آهن و استفاده از مکمل‌های آهن می‌باشد. احتمالاً مکمل آهن یاری، آسان‌ترین انتخاب برای شرایطی است که نیاز به آهن در یک دوره افزایش می‌یابد. بنابراین در گروه سنی ۲۴-۶ ماهه استفاده از مکمل آهن در کشورهای در حال توسعه، در اولویت برنامه‌های بهداشتی قرار می‌گیرد [۶]. مطالعات متعددی استفاده از آهن تکمیلی را بررسی نموده است که نتایج آن به شرح ذیل ارائه می‌شود. Hople در یک مطالعه کار آزمایی بالینی در ویتنام نشان داد که مصرف مکمل‌های آهن به صورت روزانه و یا یک بار در هفته، موجب افزایش هموگلوبین کودکان می‌شود هر چند مصرف یکبار در هفته نسبت به مصرف روزانه آن، میزان هموگلوبین را کمتر افزایش می‌داد ولی اختلافات از نظر آماری معنی‌دار نبود. هم‌چنین میزان فریتین سرم در کودکان در رژیم روزانه نسبت به پلاسیبو و یا یک بار در هفته بیشتر افزایش نشان داده بود [۷].

Smuts و همکاران نیز اثر مکمل‌ها (از جمله آهن) را به طور روزانه و یک بار در هفته در آفریقا مطالعه نموده و نتیجه گرفتند که مصرف روزانه آن نسبت به مصرف هفتگی، مناسب‌تر بوده است [۸].

در مداخلات اخیر روش‌های جدید غنی‌سازی غذاها سعی شده است که مقدار کافی آهن را در دسترس بگذارند. بنابراین Lynch عقیده دارد غنی‌سازی غذاها می‌تواند یک استراتژی قابل انجام برای کنترل فقر آهن در کشورهای غیر صنعتی باشد [۵]. Sachodeu و همکاران با مرور بر کارآزمایی‌های بالینی تصادفی انجام شده نشان دادند که مکمل آهن، تکامل مغزی را بهبود می‌بخشد و به ویژه این اثر در تست‌های هوشی کودکان ۷ سال در شروع کم خونی قابل مشاهده است [۹].

خوراندن روزانه ۱۵ قطره محلول سولفات آهن ۲۰٪ ساخت ایران در نظر گرفته شد و در غیر این صورت به عنوان مصرف نامنظم یا عدم مصرف، محسوب می‌گردید و در این گونه موارد، موانع مصرف پرسیده می‌شد. موانع مصرف قطره آهن طبق مشاهدات کلینیکی شامل سیاه شدن دندان، سیاه شدن مدفوع، عدم تحمل، بد مزه بودن، عدم تجویز توسط پزشک، فراموشی مادر، عدم نیاز کودک، نداشتن قطره آهن در نظر گرفته شد. قابل ذکر است که در صورت عدم مراجعه، مادران به صورت تلفنی پیگیری شدند که خوشبختانه کلیه موارد خود به خود یا با پیگیری تلفنی مراجعه کردند و نیاز به مراجعه به منازل نشد. داده‌ها با استفاده از نرم SPSS و آزمون‌های آماری مجذور کای و تست دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شدند. $p < 0/05$ معنی‌دار در نظر گرفته شد.

نتایج

این مطالعه روی ۱۲۰۰ شیرخوار ۶-۲۴ ماهه که ۴۶/۵٪ را پسران و ۵۳/۵٪ را دختران تشکیل می‌دادند، انجام شد. نتایج نشان داد که ۶۱/۷٪ شیرخواران قطره آهن را به طور منظم (۶۴-۵۸ CI = ۹۵٪) و ۳۸/۳٪ به طور نامنظم مصرف می‌کردند. جدول ۱ توزیع فراوانی موانع مصرف قطره آهن را در شیرخواران نشان می‌دهد. مادران شایع‌ترین دلیل عدم مصرف را سیاه شدن دندان (۲۵/۱٪) و کم‌ترین آن را سیاه شدن مدفوع (۱/۵٪) ذکر کردند (جدول ۱).

جدول ۱- توزیع فراوانی موانع مصرف قطره آهن در شیرخواران

موانع مصرف قطره آهن	تعداد (درصد)	CI ۹۵٪
سیاه شدن دندان	۱۱۵ (۲۵/۱)	۲۱-۲۹
سیاه شدن مدفوع	۷ (۱/۵)	۰-۳
عدم تحمل	۳۷ (۸/۱)	۵-۱۱
بد مزه بودن	۵۸ (۱۲/۶)	۹-۶
عدم تجویز توسط پزشک	۱۷ (۳/۷)	۲-۵
فراموشی مادر	۷۱ (۱۵/۵)	۱۲-۱۹
عدم نیاز کودک	۲۳ (۵)	۳-۷
دو دلیل	۱۰۲ (۲۲/۲)	۱۸-۲۶
بیش از دو دلیل	۲۹ (۶/۳)	۴-۹

در طی سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۸۳ دفتر سلامت خانواده و جمعیت کشور واقع در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طرح کشوری IMES (Intergrated Monitoring and Evaluation System) را تحت عنوان نظام نوین ارایه و پایش و ارزشیابی سلامت باروری در سطح ۴۱ دانشگاه علوم پزشکی اجرا کرد. بر اساس گزارش این طرح ۸/۸۹٪ شیرخواران در رفسنجان به قطره آهن رایگان دسترسی دارند ولی هیچ‌گونه گزارشی از چگونگی مصرف قطره آهن توسط شیرخواران در منزل در دسترس نمی‌باشد [۱۰].

در ایران روش غنی‌سازی غذاها هنوز شروع نشده اما استفاده از مکمل‌های آهن توسط مراکز بهداشتی، برای کودکان و مادران انجام می‌شود. این بررسی با هدف تعیین فراوانی مصرف آهن تکمیلی و موانع مصرف آهن در بین کودکان ۲۴-۶ ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی رفسنجان در سال ۱۳۸۲ انجام شد. با روشن شدن علت عدم مصرف قطره آهن در کودکان، می‌توان به ارایه راهکارهای مناسب‌تر در جهت رفع فقر آهن، کم خونی و بهتر مصرف نمودن آهن، کمک نمود زیرا اثرات کم خونی نه فقط زیان‌های اقتصادی در بر دارد بلکه بر توسعه پایدار جامعه نیز تأثیر گذار خواهد بود.

مواد و روش‌ها

این مطالعه یک بررسی مقطعی است که در طی سال ۱۳۸۲ در ۷ مرکز بهداشتی شهر رفسنجان انجام شد. با توجه به $p = 0/05$, $\alpha = 0/05$, $d = 0/03$ حجم نمونه ۱۰۶۷ نفر برآورد شد که جهت اطمینان بیشتر ۱۲۰۰ شیرخوار ۶-۲۴ ماهه مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه‌ها به طور تصادفی طبقه‌بندی شده از شیرخواران تحت پوشش ۷ مرکز بهداشتی انتخاب شدند (فاصله بین نمونه‌ها بر اساس جمعیت تحت پوشش هر مرکز، تقسیم بر حجم نمونه محاسبه شد). داده‌ها توسط پرسش‌نامه محقق ساز که مورد تأیید صاحب‌نظران قرار گرفت به دست آمد. بعد از جلب رضایت کتبی مادر، اقدام به تکمیل پرسش‌نامه که شامل اطلاعات دموگرافیک مادر و شیرخوار و چگونگی مصرف قطره آهن بود، گردید. معیار مصرف منظم،

کمترین میزان مصرف را داشته‌اند (۰/۴۸/۵۷) که اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود ($p < 0/01$).

اطلاعات دموگرافیک گروه مورد مطالعه در جدول ۲ نشان داده شده است. در مقایسه، مادران با تحصیلات دانشگاهی بیشترین میزان مصرف آهن (۰/۶۵/۲۳) و مادران بی‌سواد،

جدول ۲- توزیع فراوانی شیرخواران ۶-۲۴ ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر رفسنجان بر اساس مصرف قطره آهن و متغیرهای دموگرافیک

مقدار P	کل تعداد(درصد)	مصرف نامنظم تعداد(درصد)	مصرف منظم تعداد(درصد)	فراوانی مصرف قطره آهن متغیرهای دموگرافیک
	(۱۰۰)۶۷۸	(۲۸)۱۹۰	(۷۲)۴۸۸	۶-۱۲ ماه
$p < 0/0000$	(۱۰۰)۳۸۸	(۴۵/۶)۱۷۷	(۵۴/۴)۲۱۱	سن شیرخوار
	(۱۰۰)۱۳۴	(۶۸/۶)۹۲	(۳۱/۴)۴۲	۱۳-۱۸ ماه
	(۱۰۰)۱۱۷	(۳۵/۱)۴۱	(۶۴/۹)۷۶	۱۹-۲۴ ماه
$p < 0/0000$	(۱۰۰)۷۷۰	(۳۳/۵)۲۵۸	(۶۶/۵)۵۱۲	۲۰-۲۴ سال
	(۱۰۰)۳۱۳	(۵۱/۱)۱۶۰	(۴۹/۹)۱۵۳	۲۱-۳۰ سال
	(۱۰۰)۷۰	(۵۱/۴۳)۳۶	(۴۸/۵۷)۳۴	۳۱-۴۴ سال
	(۱۰۰)۲۷۳	(۴۵/۱)۱۲۳	(۵۴/۹)۱۵۰	بی سواد
$p < 0/01$	(۱۰۰)۱۶۹	(۳۴/۹)۵۹	(۶۵/۱)۱۱۰	میزان تحصیلات مادر ابتدایی
	(۱۰۰)۵۰۴	(۳۵/۱)۱۷۷	(۶۴/۹)۳۲۷	راهنمایی
	(۱۰۰)۱۸۴	(۳۴/۸)۶۴	(۶۵/۲)۱۲۰	دیپلوما
	(۱۰۰)۵۲۵	(۳۳/۹)۱۷۸	(۶۶/۱)۳۴۷	دانشگاهی
$p < 0/000$	(۱۰۰)۳۴۲	(۳۶/۸)۱۲۶	(۶۳/۲)۲۱۶	رتبه تولد
	(۱۰۰)۱۸۱	(۳۹/۲)۷۱	(۶۰/۸)۱۱۰	اول
	(۱۰۰)۱۵۲	(۵۵/۳)۸۴	(۴۴/۷)۶۸	دوم
				سوم
				چهارم

کارگر و خانه‌دار قطره آهن بیشتری مصرف می‌کردند (به ترتیب ۰/۶۲/۴، ۰/۴۷/۸، ۰/۶۴/۲) که اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود ($p = 0/02$).

بحث

کمبود آهن، شایع‌ترین بیماری تغذیه‌ای در جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه می‌باشد. در واقع علت اصلی کم خونی در شیرخواران و کودکان فقر آهن می‌باشد. راه‌های متعددی برای پیشگیری از کمبود آهن در گروه سنی ۶-۲۴ ماهه وجود دارد. در ایران در مراکز بهداشتی از

بالاترین میزان مصرف قطره آهن در فرزند اول خانواده (۰/۶۶/۱) و کمترین آن در فرزند چهارم به بعد (۰/۴۴/۷) بود. که اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود ($p < 0/000$). بالاترین میزان مصرف قطره آهن در گروه سنی ۶-۱۲ ماهه و معادل ۷۲٪ بود که اختلاف آماری معنی‌دار در مقایسه با سایر رده‌های سنی شیرخوار داشت ($p < 0/0000$).

مقایسه مصرف قطره آهن در پسران و دختران نشان داد که ۶۲/۹۱٪ پسران و ۶۰/۷٪ دختران آهن مصرف می‌کنند ولی این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار نبود. مقایسه شغل مادران نشان داد که شیرخواران مادران کارمند نسبت به مادران

در مطالعه ما شغل مادر و تحصیلات مادر از فاکتورهای مهم در مصرف قطره آهن بود. به طوری که که مادران تحصیل کرده و شاغل با آگاهی بیشتری سعی در بر طرف کردن نیازهای کودک خود دارند. در یک مطالعه در اسرائیل با پیگیری نسخه‌های متخصصین اطفال در سطح داروخانه‌ها که شامل فراورده‌های آهن بود مشخص شد که تنها ۲۷٪ والدین داروی محتوی آهن را خریداری می‌کنند و اکثر خریداران قطره آهن از طبقات اقتصادی پایین جامعه بودند. افراد با وضعیت اقتصادی خوب اظهار داشتند به دلیل اینکه غذاهای حاوی آهن (گوشت) به کودک خود می‌دهند نیاز به قطره آهن ندارند [۱۲] ولی در مطالعه حاضر ۳۷٪ نمونه‌ها دلیل عدم مصرف قطره آهن را، عدم تجویز پزشک و ۱۵/۵٪ ناشی از فراموشی مادر دانستند. علی‌رغم این که در ایران اکثر مادران قطره آهن را به طور رایگان در اختیار دارند با این حال فقط ۶۱/۷٪ قطره آهن را به طور منظم مصرف می‌کردند. مقایسه نتایج مطالعه حاضر و بقیه مطالعات نشانگر این است که سرمایه‌گذاری بیشتر در جهت ارایه قطره آهن لازم نبوده بلکه آموزش و تغییر نگرش مادران از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. با افزایش سن و رتبه تولد، عدم مصرف قطره آهن افزایش می‌یابد هر چند توجه علمی برای این مسئله وجود ندارد ولی شاید بتوان گفت که با افزایش سن مادر و رتبه تولد، میزان حساسیت مادر کاهش یافته و اهمیتی به آموزش‌های ارایه شده توسط کارکنان بهداشت نمی‌دهد. بین میزان مصرف قطره آهن و جنس شیرخوار ارتباط معنی‌داری وجود نداشت. ولی با افزایش سن شیرخوار میزان مصرف قطره آهن کمتر شده است و اختلاف معنی‌دار است.

نتیجه‌گیری

این بررسی نشان داد بیشتر علل ذکر شده جهت عدم مصرف قطره آهن توسط مادران، غیر منطقی بوده است. مادران بیسواد، شیرخواران (زیر ۲ سال) و مادران با سن بالاتر و رتبه تولد بیشتر، کمترین میزان مصرف را داشتند. با توجه به میزان بالای مصرف نامنظم قطره آهن و دلایل غیرمنطقی آن، آموزش بیشتر مادران توسط مراکز بهداشتی و پزشکان و

مناسب‌ترین روش‌ها یعنی تشویق تغذیه با شیر مادر، عدم مصرف شیر گاو در سال اول تولد و طرح مکمل آهن یاری به طور رایگان برای پیشگیری از آنمی فقر آهن در شیرخواران استفاده می‌شود اما متأسفانه طبق بررسی‌های متعدد، کم خونی ناشی از کمبود آهن در ایران شایع می‌باشد [۳-۲].

اطلاعات کمی در مورد چگونگی مصرف قطره آهن در شیرخواران در ایران وجود دارد ولی مشاهدات کلینیکی نشان می‌دهد که تعدادی از مادران به دلایل غیر منطقی از خوردن قطره آهن به شیرخواران خود امتناع می‌کنند.

در این مطالعه که روی ۱۲۰۰ شیر خوار ۲۴-۶ ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشت انجام شد ۳۸/۳٪ مادران قطره آهن را به طور نامنظم مصرف می‌کردند. موانع مصرف طبق اظهار مادران سیاه شدن دندان‌ها (مشکل زیبایی)، سیاه شدن مدفوع، عدم تحمل، بدمزه بودن، عدم تجویز توسط پزشک، فراموشی مادر، عدم نیاز کودک ذکر شد. ۲۸/۵٪ مادران بیشتر از یک دلیل را مطرح کردند. در مورد بد مزه بودن قطره آهن و عدم تحمل، بایستی راهکارهای مناسب را پیدا کرد و در این جهت می‌توان از غنی‌سازی غذاها به جای طرح آهن یاری استفاده کرد یا قطره آهن، به طور هفتگی مصرف شود. در این زمینه مطالعات متعددی انجام شده است [۱۱].

Berger و Hople اثر آهن همراه با سایر ریزمغذی‌ها را به صورت هفتگی، در ویتنام در یک مطالعه کار آزمایی بالینی بررسی کردند و نشان دادند که مصرف مکمل‌ها به صورت روزانه و یا یک بار در هفته موجب افزایش هموگلوبین کودکان می‌شود هر چند مصرف یکبار در هفته نسبت به مصرف روزانه آن، میزان هموگلوبین را کمتر افزایش می‌داد ولی اختلافات از نظر آماری معنی‌دار نبود. هم‌چنین میزان فریتین سرم در کودکان در رژیم روزانه نسبت به پلاسیبو و یا یک بار در هفته بیشتر افزایش نشان داده بود [۷].

Smuts و همکاران نیز اثر مکمل‌ها (از جمله آهن) را به طور روزانه و یک بار در هفته در آفریقا مطالعه نمودند که مصرف روزانه آن مناسب‌ترین بوده است [۸].

آهن را به صورت نامنظم دریافت می کنند بایستی از نظر آنمی فقر آهن ارزیابی و درمان شوند.

همچنین متخصصین اطفال و یا غنی سازی غذاهای شیرخواران با آهن پیشنهاد می شود. شیرخوارانی که قطره

References

- [1] Hultell RF, Lgnch S, Both W. Enhancing the absorption of fortification Iron. As sustain task force report. *In J Vitamin Not Res*, 2004; 74(6): 387-401.
- [2] Lgnch SR. The Impact of Iron fortification on nutritional anemia. *Best Pract Res Clin Hemitol*, 2005; 18(2): 333-46.
- [3] Foo LH, Khor GL, Tee ES, Dhanaraj P. Determinatint of iron status in Malajgian adolescents from a rural community. *Int J Food Sci Nutr*, 2004; 55(6): 517-25.
- [4] Garrow JIS, James WPT, Raph A. Human nutrition and Dietetics. 10th ed. Edinburgh-London. Churchill Livingstone. 2000; pp: 177-9.
- [5] Lynch SR. The impact of Iron fortification on nutritional anemia. *Best pract Res Clin Haematol*, 2000; 18(2): 333-46.
- [۶] استوارت گ. مسائل اساسی در کنترل فقر آهن. گروه مترجمان. نشر علوم کشاورزی - ۱۳۷۸.
- [7] Hople T, Berger J. Multiple micronutriments supplantation Improves anémia, micronutrimet. Nutrient status and growth of Vietnamese infants double- blind, randomized placebo controlled trial. *J Nutr*, 2005; 133(3): 6605-55.
- [8] Smuts CM, Dhansay MA, FaberM, Van Stuijvenberg ME, Swanevelde S, Gross R, et al. Efficacy of multiple micronutrient supplementation for improving anemia, micronutrient status and growth in South African Infants. *J Nutr*, 2005; 135(3): 653-9.
- [9] Sachdeu H, Grea T, Nestel P. Effect of iron supplementation on mental and motor development in children: systemic review of randomized controlled trials. *Public Health Nutr*, 2005; 8(2): 117-32.
- [۱۰] وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دفتر سلامت خانواده و جمعیت کشور طرح نظام نوین ارایه پایش و ارزشیابی سلامت باروری (IMES). سال ۱۳۸۵-۱۳۸۳.
- [11] Fischer Walker C, Kordas K, Stoitzfus RJ, Black RE. Interactive effects of Iron and zinc on biochemical and functional outcomes in supplementation trials. *Am J clin Nutr*, 2005; 82(1): 5-12.
- [12] Amsel S, Boaz M, Ballin A, Filk D, Ore N. Low compliance of iron supplementation in infancy and relation to socioeconomic status in Israel. *Pediatrics*. 2002; 110(2Pt1): 410-1.