مقاله پژوهشی مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره نهم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۸۹، ۲۴۲–۲۴۹

مقایسه اثر درمانی دزیپرامین و سرترالین در افسردگی بیماران مبتلا به آلزایمر

نغمه مخبر ا، محمودرضا آذرپژوه ، على طلايي "

دريافت مقاله: ۸۶/۶/۳۱ ارسال مقاله به نويسنده جهت اصلاح: ۸۷/۲/۴ دريافت اصلاحيه از نويسنده: ۸۸/۹/۱۴ پذيرش مقاله: ۸۹/۶/۳۸

چکیده

زمینه و هدف: یکی از اختلالات رایج همراه با آلزایمر، افسردگی است. شناخت درمانهای مناسبتر و کم عارضهتر، در این بیماران حائز اهمیت میباشد. این مطالعه به ارزیابی مقایسهای دو داروی دزیپرامین و سرترالین در درمان افسردگی در بیماران مبتلا به آلزایمر پرداخته است.

مواد و روشها: در این کارآزمایی بالینی یکسوکور، ۶۳ بیمار با تشخیص آلزایمر (به طور تصادفی ۲۹ نفر در گروه در پرامین و ۳۴ نفر در گروه سرترالین و یا دزیپرامین قرار گرفتند که در صورت نیاز، به تدریج تا ۱۵۰ میلیگرم افزایش داده شد. مقیاس وابستگی روانی پیری، آزمون هامیلتون افسردگی و معاینه مختصر وضعیت روانی در هفته ۴ انجام شد و عوارض جانبی داروها نیز بررسی گردید.

یافتهها: در گروه سرترالین تغییرات خلقی در تمام هفتهها در مقایسه با ابتدای مطالعه معنی دار بود $(p<\cdot \cdot \cdot \circ)$ اما در گروه دزیپرامین، تنها بین شروع و هفته ۱۲ تفاوت معنی دار وجود داشت $(p<\cdot \cdot \cdot \circ)$. بهبود افسردگی در گروه سرترالین به طور معنی داری بر اساس مقیاس کرنل بیشتر بود $(p=\cdot \cdot \cdot \circ)$. تغییرات عملکرد در فعالیتهای روزمره در گروه دزیپرامین معنی داری بود $(p<\cdot \cdot \circ)$ اما در گروه سرترالین تفاوت معنی دار بین دو گروه دیده شد. میزان تغییرات شناختی در هر دو گروه تفاوت معنی داری نداشت و تفاوت بین دو گروه نیز معنی دار نبود.

نتیجه گیری: سرترالین در کاهش افسردگی بیماران مبتلا به آلزایمر مؤثرتر از دزیپرامین میباشد. هیچکدام از این دو دارو علی رغم اثرات ضد افسردگی، بر عملکرد شناختی بیماران تأثیری نداشتند.

واژههای کلیدی: آلزایمر، دمانس، افسردگی، سرترالین، دزیپرامین

۱- دانشیار گروه اَموزشی روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۲- دانشیار گروه آموزشی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۳- (نویسنده مسئول) استادیار گروه آموزشی روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد تلفن: ۰۵۱۱-۷۱۱۲۷۲۲- دورنگار: ۳۵۱۱-۷۱۱۲۷۲۳، یست الکترونیکی: talaeia@mums.ac.ir

مقدمه

بیماری آلزایمر یکی از مشکلات شایع در سنین بالا میباشد [۳-۱] که به دلیل افزایش جمعیت سالمندی، رو به تزاید است [۴]. علاوه بر اختلالات شناختی که هسته اصلی این بیماری را شامل میشود، همراهی سایر بیماریهای روانپزشکی از جمله اختلالات رفتاری و خلقی، پیامد و سیر این بیماری را رو به وخامت میبرد و درمان این اختلالات همراه نیز خود توجه بالینی خاصی را میطلبد [۷-۵].

یکی از اختلالات رایج همراه با آلزایمر، افسردگی است [۸]. این اختلال پیامدهای بسیار ناخوشایندی دارد [۹-۱۱] و علاوه بر مشکلاتی که برای بیمار ایجاد میکند، برای مراقبین این بیماران نیز مشکلساز میباشد [۱۲-۱۴]. افسردگی بیماران مبتلا به آلزایمر میتواند منجر به خودکشی [۱۵]، افزایش ناتوانی [۱۱]، افزایش میزان مرگومیر [۱۶]، شکایات جسمانی [۱۸-۱۸] و وخامت وضعیت شناختی [۲۰-۱۹] شود. درمان این اختلال، کلیه معضلات فوق را تقلیل داده و کیفیت زندگی بیماران را ارتقاء میدهد [۲۳-۲۲]. با این حال، درمانهای مختلفی که برای درمان این اختلال در آلزایمر پیشنهاد شده است، متفاوت میباشد. برخی مؤلفین به نقش داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای اشاره کرده اند [۲۶-۲۴] در حالی که عوارض آنتی کولینرژیک و سایر عوارض جانبی این داروها می توانند اثرات مخربی بر ناتوانیهای شناختی فرد بگذارند [۲۷]. در بین این داروها دزیپرامین و نورتریپتیلین به دلیل این که کمترین عوارض آنتی کولینرژیک را دارند، هنوز مورد استفاده قرار می گیرند [۲۸]. داروهای ضدافسردگی مهارکننده اختصاصی

بازجذب سروتونین، یکی از درمانهای رایج در افسردگی بيماران آلزايمر مىباشند [٢٩]. اين داروها به دليل عوارض جانبی محدودتر، برای درمان افسردگی انتخاب مطلوبتری هستند. با این حال، اثرات ضدافسردگی این داروها در مواردی که شدت افسردگی در حد اختلال افسردگی اساسی است، توسط برخی محققین مورد تردید است [۳۰]. بیخوابی و تحریکپذیری و همچنین تحریکات گوارشی از جمله عوارض جانبی شایع در مصرف داروهای ضدافسردگی مهارکننده اختصاصی بازجذب سروتونین میباشند که میتوانند مصرف آنها را محدود کنند [۳۱]. معمولاً در تجویز داروهای اخیر، نیاز به مصرف همزمان داروهای آرامبخش وجود دارد که خود میتواند بر عملکرد شناختی و کیفیت زندگی بیمار اثر نامطلوبی داشته باشد [۳۳–۳۲]. با توجه به این که هنوز برتری مشخص داروهای ضدافسردگی خاصی در درمان افسردگی بیماران مبتلا به آلزایمر به تأیید نرسیده است، این پژوهش به مقایسه اثرات سرترالین و دزیپرامین بر افسردگی، عملکرد شناختی و فعالیتهای روزمره زندگی این بیماران پرداخته است.

مواد و روشها

این مطالعه یک کارآزمایی بالینی یکسوکور است. ۷۴ بیمار با تشخیص بیماری آلزایمر بر اساس معاینه بالینی، شرح حال، یافتههای سیتی اسکن مغز یا MRI مغز، از دیماه ۱۳۸۳ لغایت اردیبهشت ۱۳۸۶ که به طور سرپایی به بیمارستانهای آموزشی ابنسینا و قائم (عج) مشهد مراجعه نموده بودند، مشمول مطالعه شدند. بیماران به طور تصادفی به ۲ گروه تقسیم شدند: ۳۶ نفر تحت درمان با دزیپرامین و ۳۸ نفر در گروه سرترالین قرار گرفتند.

کلیه بیماران یا قیم قانونی آنها فرم رضایتنامه آگاهانه را امضاء کردند.

بیماران بر اساس معیارهای کتابچه تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM- IV) و مصاحبه نیمهساخت یافته توسط روانپزشک، مبتلا به دمانس مرحله ۱ و ۲ و اختلال افسردگی اساسی تشخیص داده شده بودند و تمیز بین افسردگی و علایم "عدم جذابیت" و "بیانگیزگی" موجود در آلزایمر توسط روانپزشک تعیین شد.

بیمارانی مشمول طرح شدند که نیاز به بستری نداشتند و داروهایی که به دلیل سایر بیماریهای جسمانی دریافت می کردند، تنها محدود به داروهای مهارکننده گیرنده هیستامینی نوع ۲، داروهای ضدفشارخون و سایر داروهای قلبی – عروقی و داروهای کاهنده کلسترول بود. مصرف هر داروی مؤثر بر روان (به جز مهارکنندههای داروی مؤثر بر روان (به جز مهارکنندههای استیل کولیناستراز) در ۲ هفته قبل از مراجعه، باعث حذف بیمار از مطالعه می شد. سوءمصرف مواد و سابقه اختلال دوقطبی، اختلالات اضطرابی یا روان پزشکی نیز از جمله موارد حذف بیمار بودند.

برای کلیه بیماران در ابتدای مطالعه، آزمون هامیلتون افسردگی Hamilton rating depression scale (نمره بالاتر شاخص افسردگی شدیدتر است) [۳۴]، آزمون معاینه مختصر وضعیت روانی Mini mental status معاینه مختصر وضعیت روانی (MMSE) examination مطلوبتر شناختی است) [۳۵] و بخش فعالیتهای Psycho geriatric و بخش فعالیتهای روزمره مقیاس وابستگی روانی پیری (PDRS) dependency rating scale شاخص ناتوانی بیشتر بیمار است) به عمل آمد. بیماران با ۲۵ میلی گرم بدون اطلاع از نوع دارو تحت درمان با ۲۵ میلی گرم


سرترالین و یا همان میزان دزیپرامین، دوز واحد شبانه قرار گرفتند. در هفته بعد، این مقادیر به ۵۰ میلیگرم در روز با همان دوز واحد شبانه افزایش یافت و تدریجاً در صورت نیاز به ۱۵۰ میلیگرم (تا پایان هفته چهارم) افزایش داده شد.

پیگیری بالینی و تکرار آزمونها در هفتههای ۲، ۴، ۸ و ۱۲ در محل کلینیک صورت میگرفت. به بیماران و خانواده آنها در هر نوبت مراجعه حمایتهای هیجانی و آموزشهای بالینی ارائه گردید. در فواصل بین مراجعات، تماس تلفنی به طور هفتگی جهت بررسی عوارض جانبی و حمایت از پیشبرد درمان انجام میشد.

۶۳ بیمار مطالعه را تا پایان ۱۲ هفته کامل کردند. بر اساس آزمون مجذور کای تفاوت آماری معنیداری بین میزان خروج از مطالعه در دو گروه وجود نداشت. در طی هر ملاقات (هفتههای ۲، ۴، ۸ و ۱۲) آزمونهای PDRS و هامیلتون افسردگی و MMSE تکرار شد و عوارض جانبی دارو مورد بررسی قرار گرفت. مقیاس کرنل برای افسردگی در دمانس Cornell scale for depression in dementia (CSDD) (نمره بالاتر شاخص افسردگی شدیدتر است). [۳۶] در هفته چهارم به عمل آمد، در صورتی که بر اساس وضعیت بیمار یا اظهارات خانواده نیاز به مداخله بیشتر و درمانهای کمکی و یا بستری در بیمارستان وجود داشت، بیمار از مطالعه خارج میشد. انجام ازمونهای بیماران و تجویز دارو توسط دو بالینگر مجزا و غیرمطلع از نتایج یکدیگر، صورت میپذیرفت. تحلیل آماری نهایی برای تغییرات ابتدا و انتهای مطالعه بر اساس تعداد بیمارانی که مطالعه را تکمیل نمودند (۶۳ نفر طبق نمودار ۱) به کمک نرمافزار SPSS ویرایش ۱۴ با استفاده از آزمون دقیق فیشر

جهت مقایسه نتایج بهدست آمده، صورت پذیرفت و تغییرات بر اساس آزمونهای ابتدای مطالعه و مقاطع مورد بررسی با آزمون تحلیل واریانس با تکرار اندازه گیریها انجام شد. کلیه تحلیلهای آماری بر اساس تحلیل متمرکز

بر درمان (Intension to treat) در انتهای مطالعه انجام \mathcal{D} رفت و آزمونهای مورد استفاده در جداول مربوطه ذکر شدند. p<-1/2 معنی دار در نظر گرفته شد.



نمودار ۱- تعداد بیماران مشمول مطالعه در ابتدا و انتهای بررسی مقایسه سرترالین و دزیپرامین در درمان اختلال افسردگی اساسی همراه با آلزایمر

نتايج

متغیرهای جمعیتشناختی بیماران شامل سن، جنس، وضعیت سکونت و شاخصهای بالینی آنها شامل نمرات

مقیاسهای وابستگی روانی پیری، هامیلتون افسردگی و معاینه مختصر وضعیت روانی در هر دو گروه در جدول ۱ آمده است.

جدول ۱- مقایسه شاخصهای جمعیتشناختی و بالینی بیماران در گروههای سرترالین و دزیپرامین در درمان اختلال افسردگی اساسی همراه با آلزایمر بر اساس تحلیل متمرکز بر درمان

شاخص		گروه سر ترالین (۳۴ نفر)	گروه دزیپرامین (۲۹ نفر)	P value آزمون تی دانشجویی
سن (سال)	میانگین± انحراف معیار	Υ \ / V ±۵/Δ	V•/9±٣/9	٠/٨۴
جنس (مرد)	تعداد (درصد)	(48/44) 48	(۵1/۲۲) ۱۵	•/•۴
	همراه با پرستار	(41/14) 14	(1 • / ٣٤) ٣	
وضعيت سكونت	همراه با فرزندان	((1 / 4 / 4)	(٣٧/٩۴) 11	
تعداد(د _ر صد)	مراکز نگهداری	·) ·	(۶/۸۹) ۲	٠/٣١
	همراه با همسر	(۲9/۴۱) 1.	(44/84) 14	
معاینه مختصر وضعیت روانی (نمره کل)	ميانگين± انحراف معيار	۱ ۲/۶±۶/۵	ヽ て/9±۶/人	٠/٨٢
مقیاس هامیلتون افسردگی (نمره کل)	میانگین± انحراف معیار	74/V±8/7	۲۵/۵±۷/۴	•/۴٢
مقیاس وابستگی روانی پیری	نمره فعاليت روزانه	۹/۲±۸/۴	ለ/∀± ۶/٩	٠/٣٨

در فواصل ۲، ۴، ۸ و ۱۲ هفته مقایسه شده است.

در جدول ۲ تغییرات ایجاد شده در خلق و فعالیتهای روزمره و همینطور وضعیت شناختی بیماران در دو گروه

جدول۲- تغییرات شاخصهای بالینی در هفتههای ۲، ۴، ۸ و ۱۲ در ۶۳ بیمار مبتلا به افسردگی اساسی و آلزایمـر در دو گـروه تحـت درمـان بـا سرترالین و دزیپرامین

P **	هفته دوازده		هفته هشت		هفته چهار		دو	هفته		_
	ِاف معيار	میانگین انحر	رافمعيار	میانگین انح	راف معيار	میانگین انح	افمعيار	میانگین انحر		متغير
•/•٢	۵/۹	-۲/۱	۵/۲	-۲/۴	۵/۴	- T/Y	۴/٣	-۲/٩	گروه	CSDD
, ,	17/8	-11/ *	٧/٩	-9/9*	٧/۴	- \ / ۴*	۶/۹	- ۲/۶*	دزيپرامين	CSDD
									گروه سرترالین	
•/•٨	٧/٢	- ۴ / ۲*	8/4	-٣	٧/۴	- * / * *	٣/٢	-1/9	گروه	
	۱۲/۵	-11/8*	۱ • /۵	-9/4*	١١/٢	$-A/A^{oldsymbol{st}}$	۶/۹	_ * / * *	دزيپرامين	HRDS
									گروه سرترالین	
٠/۶	۵/۲	۲/۶*	۲/٨	7/* *	۵/۲	• 18	۴/٨	-•/ ۴	گروه	
•17	۴/۵	٠/۵	۵/۴	- • /Y	4/9	-•/ 9	٣/٢	-•/ 从	دزيپرامين	PDRS
									گروه سرترالین	
	۲/۵	1/٢	۲/۳	•/٨	1/Y	• 18	4/1	1/4	گروه	
•/11	۴/٨	-1/0	۵/۳	-1/1	۴/۵	-1/9	٣/۵	٠/۴	دزيپرامين	MMSE
									گروه سرترالین	

*: تفاوت معنی دار با خط پایه (پیش از درمان) بر اساس آزمون تی دانشجویی (df=۲۲ برای گروه سرترالین و ef=۲۰ برای گروه دزیپرامین)
**: Repeated measurements ANOVA with baseline score as covariant

در گروه تحت درمان با سرترالین، تغییرات خلقی ایجاد شده در تمام هفتهها در مقایسه با ابتدای مطالعه با هـر دو آزمون HRDS و CSDD معنی دار بود حال آن که در گـروه تحت درمان با دزیپرامین این تفاوت تنها در نتایج HRDS بین شروع و هفته ۱۲ معنی دار بود (p<-1/-1). تفاوت بین دو گروه بر اساس آزمون CSDD معنی دار بـود (p=-1/-1). از نظر عملکرد در فعالیتهای روزمره، تغییرات ایجاد شـده در مقایسه با خط پایه بر اساس آزمون PDRS در هفته ۸ در مقایسه با خط پایه بر اساس آزمون p<-1/-1 امـا در گروه دزیپرامین معنـی دار بـود (p<-1/-1) امـا در گروه سرترالین از نظر آماری معنا نداشت و تفاوت بـین دو گروه سرترالین از نظر آماری معنا نداشت و تفاوت بـین دو

گروه نیز معنی دار نبود (p=+/۶). از نظر میزان تغییرات شناختی ایجاد شده در مقایسه با خط پایه بر اساس MMSE در هر دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد و تفاوت بین دو گروه نیز معنی دار نبود.

در گروه تحت درمان با سرترالین عارضه بارزی که منجر به قطع درمان یا توجه طبی شود، دیده نشد. در گروه دزیپرامین خشکی دهان و یبوست عوارض شایعی بودند که به ترتیب Λ و Δ نفر از آنها شاکی بودند ولی منجر به قطع درمان نشد.

بحث

در این آزمایه بالینی افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و بیماری آلزایمر از نظر پاسخ به درمانهای دارویی با سرترالین و دزیپرامین مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که سرترالین در کاهش افسردگی این بیماران مؤثرتر از دزیپرامین میباشد. هر یک از این دو دارو علی رغم اثرات ضدافسردگی، بر عملکرد شناختی بیماران تأثیری نداشتند.

اثر سرترالین بر خلق بیماران مبتلا به آلزایمر در مطالعات دیگری نیز به اثبات رسیده بود [۲۹، ۳۹-۳۳]. حجم نمونه در این مطالعات کمتر از حجم نمونه مطالعه حاضر بوده است. علاوه بر این، در این مطالعات مقایسه با دارونما و همچنین داروهای مهارکننده مونوآمینواکسیداز صورت گرفته بود. از طرفی، تحقیقات دیگری انجام شده است که اثربخشی داروهای ضدافسردگی را در درمان بيماران مبتلا به آلزايمر زير سؤال بردهانـد [۴۰] و لـذا بــا نتایج مطالعه حاضر به درجاتی متناقصاند. این مطالعات عموماً از نظر ساختاری با مطالعه حاضر تفاوت داشتند. بـه عنوان مثال تفاوتهای سطح افسردگی در گروه داروییی و دارونما از همان ابتدای مطالعه متمایز بود و یا هم بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و هم بیماران با درجات خفیفتر افسردگی را شامل میشدند. در برخی دیگر، سطح آسیب عملکرد شناختی در دو گروه متفاوت بود. بنابراین، هیچ کدام از مطالعات فوق قادر به اظهار نظر صریح در خصوص اثربخشی داروهای ضدافسردگی در افسردگی اساسی همراه با بیماری آلزایمر نبودند.

در مطالعه حاضر، تغییری در سطوح شناخت بیماران قبل و پس از درمان یافت نشد که با بعضی از مطالعات

پیشین که معتقدند درمانهای چند رویکردی قادرند بر روند بهبودی تأثیر داشته باشند [۴۱]، هماهنگی دارد.

محققینی که به نتایج متفاوت دست یافتند معتقدند که درمانهای ضد افسردگی عملکرد شناختی بیماران مبتلا به آلزایمر را تا حدودی بهبود میبخشند [۴۲]. بایـ د خاطرنشان کرد که این پژوهشگران، عمده مطالعات خود را در بیمارانی انجام دادهاند که علایم افسردگی در آنها در حد تکمیل معیارهای اختلال افسردگی اساسی نبود و علاوه بر این، مطالعات بر روی افراد مبتلا به مرحله اول دمانس صورت گرفته بود. این احتمال وجود داردکه تخمین اولیه از سطوح شناختی، تحت تأثیر علایم مزمن و خفیف افسردگی قرار گرفته باشد و آنچه در نهایت به عنوان بهبود علایم شناختی مورد ارزیابی قرار گرفته، کاهش علایم افسردگی مؤثر بر ارزیابی اولیه بوده است. حال آن که در درجات مشخص و بارز افسردگی، تفکیک علایم افسردگی و مشکلات شناختی وضوح بیشتری دارد و خطر اشتباه شدن علایم کمتر میباشد. چنانچه ذکر شد در مطالعه حاضر به جهت رفع این نقیصه، معیارهای مورد تأكيد در تشخيص به وضوح تعريف شدند. البته بايـد ايـن نکته را در نظر گرفت که در مطالعه حاضر هر چند بهبود بارز شناختی بدست نیامد، مشکلات شناختی بیمار یا ثابت بودند و یا افزایش اندک در این توانمندی ها مشاهده گردید.

درمان با دزیپرامین و سرترالین هر دو با بهبود عملکردهای روزمره فرد همراه بودند، هر چند این تغییر از نظر آماری در حد چشمگیری نبود، می توان با توجه به اهمیت بهبود خفیف از نظر بالینی همین پیشرفت اندک را نیز مورد توجه قرار داد (با در نظر گرفتن ایس که داروی

دزیپرامین پس از گذشت چند هفته، بهبودی در حد تمایز آماری معنیدار در این توانایی ایجاد نمود). یافته اخیر هم راستا با نتایج مطالعات دیگری است که معتقدند درمانهای ضدافسردگی باعث بهبود سایر علایم آلزایمر از جمله عملکرد روزمره و رفتار فرد میشوند [۴۳-۴۴].

در این مطالعه سرترالین در مقایسه با دزیپرامین بهبود خلقی بارزتری ایجاد کرد و عوارض جانبی ایجاد شده نیز در گروه تحت درمان با سرترالین کمتر از دزیپرامین بود. مطالعات دیگری در دست است که نشان دادهاند داروهای مهار کننده اختصاصی بازجـذب سروتونین در مقایسه با داروهای ضدافسردگی دیگر، اثر بهتر و عوارض کمتری در درمان افسردگی بیماران مبتلا به دمانس دارند [۳۱] و حتى برخى مطالعات به برترى سرترالين بر آمىتريپتيلين و کلومپیرامین اشاره کردهاند [۴۵]. از آنجا که در بین داروهای ضدافسردگی چندحلقهای، دزیپرامین کمترین عوارض جانبی ضد کولینرژیکی را داراست، مطالعه حاضر نشان می دهد که نه تنها داروهای با اثرات مهار کننده سیستم کولینرژیک که عوارض بالایی را می توانند باعث شوند، بلکے حتے داروی دزیپرامین نیز کے عوارض محــدودتری دارد در مقایـسه بـا ســرترالین از اولویــت پایین تری برخوردار است و تردیدهایی که از نظر تشدید بیقراری و اختلالات رفتاری در اثر مصرف داروهای مهارکننده بازجذب سـروتونین وجـود دارد [۴۶] شـاید بـا نتایج حاصل از این مطالعه که نشان داد هیچ بیماری به دلیل عوارض غیر قابل تحمل دارویی از گروه سرترالین خارج نشد، تعدیل گردد.

با وجود این، پژوهش فوق دارای محدودیتهایی نیز میباشد. از آنجا که مرکز واحدی برای مراجعه بیماران

مبتلا به دمانس در دسترس نبود و یافتن بیمارانی که معیارهای حذف و شمول مطالعه را کامل کنند با مشکلات و محدودیتهای زیادی همراه بود، حجم نمونه در حد تحلیل مشخص و قابل تعمیم عوارض جانبی نمیباشد. عدم حضور گروه تحت درمان با دارونما، که به دلیل معنوریات اخلاقی صورت گرفت، یکی دیگر از محدودیتهای مطالعه حاضر است. مطالعه حاضر مشکلات رفتاری بیماران و اثرات درمانی را بر این علایم مورد بررسی قرار نداده است و حال آن که این علایم نیز می توانند خود به تنهایی ارزش تحلیل داشته و بر عملکرد فرد تأثیر جدی داشته باشند.

در ایس مطالعه، تنها بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای دانشگاهی بیمارستانهای ابینسینا و قائم (عج) مورد بررسی قرار گرفتند. شایان ذکر است که در صورت وجود مرکز ثبت و پیگیری آلزایمر، دسترسی به بیماران با سطوح اجتماعی متفاوت و حمایتهای خانوادگی و پرستاری مختلف میسر می شود. چنانچه ملاحظه شد تعداد محدودی از این بیماران تحت پرستاری افراد بیگانه (به جز خانواده) و یا مراکز نگهداری بودند. بی شک اثر حمایتهای عاطفی، در نتایج بهدست آمده مؤثر بوده است و تحلیل این عامل نیاز به مطالعات وسیعتری دارد.

با وجود محدودیتهای فوق و سؤالات بیپاسخ زیادی که در درمان افسردگی بیماران آلزایمر وجود دارد مطالعه حاضر از آنجا که از جمله نخستین مطالعات انجام شده از این دست در کشور ما میباشد، شاید در درمان بیماران مبتلا به دمانس و افسردگی گامی به جلو باشد. مطالعات آتی در مورد طول مدت درمان و اثر عوامل روانشناختی

تشکر و قدردانی

تحقیق فوق که در طی مدت حدود ۲۸ ماه انجام شد بدون همکاری پرسنل محترم و پر تالاش درمانگاههای بیمارستان آموزشی پژوهشی قائم (عج) و بیمارستان تخصصی روانپزشکی ابن سینای مشهد و نیز اعضای محترم گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدور نبود که محققین لازم میدانند مراتب سپاس خود را از مساعی ایشان ابراز نمایند. ضمنا محققین در این تحقیق از هیچ منبع مالی استفاده ننموده و هیچ تضاد منافعی با نتایج آن نداشتند.

در درمان افسردگی بیماران مبتلا به آلزایمر می تواند پاسخگوی بخش بیشتری از سؤالات بالینگران در این زمینه باشند.

نتيجهگيري

سرترالین در کاهش افسردگی این بیماران مؤثرتر از دزیپرامین میباشد. هیچکدام از آنها علی رغم اثرات ضدافسردگی، بر عملکرد شناختی بیماران تأثیری نداشتند.

References

- [1] Lopes MA, Hototian SR, Bustamante SE, Azevedo D, Tatsch M, Bazzarella MC, et al. Prevalence of cognitive and functional impairment in a community sample in Ribeirao Preto, Brazil. *Int J Geriatr Psychiatry* 2006; 22(8): 770-6.
- [2] Heath JM, Brown M, Kobylarz FA, Castano S. The prevalence of undiagnosed geriatric health conditions among adult protective service clients. *Gerontologist* 2005; 45(6): 820-3.
- [3] Low LF, Brodaty H, Edwards R, Kochan N,

 Draper B, Trollor J, et al. The prevalence of

 "cognitive impairment no dementia" in

- community-dwelling elderly: a pilot study. *Aust N Z J Psychiatry* 2004; 38(9): 725-31.
- [4] Olivera Pueyo FJ, Rodriguez Torrente M,
 Lorente Aznar T, Benabarre Ciria S, Pardo
 Gracia MA, Ceresuela Lopez A. [Screening for
 factors relating to the development of mental
 disorders in the geriatric population
 (PSICOTARD)]. Aten Primaria 2006; 38(6):
 353-7.
- [5] Zuidema SU, de Jonghe JF, Verhey FR,
 Koopmans RT. Neuropsychiatric symptoms in
 nursing home patients: factor structure
 invariance of the dutch nursing home version of
 the neuropsychiatric inventory in different

- stages of dementia. Geriatr Cogn Disord

 Dement 2007; 24(3): 169-76.
- [6] Andrieu S, Rive B, Guilhaume C, Kurz X, Scuvee-Moreau J, Grand A, et al. New assessment of dependency in demented patients: impact on the quality of life in informal caregivers. *Psychiatry Clin Neurosci* 2007; 61(3): 234-42.
- [7] Conn D, Thorpe L. Assessment of behavioural and psychological symptoms associated with dementia. *Can J Neurol Sci* 2007; 34 Suppl 1: 67-71.
- [8] Berger AK, Fratiglioni L, Winblad B, Backman L. Alzheimer's disease and depression: preclinical comorbidity effects on cognitive functioning. *Cortex* 2005; 41(4): 603-12.
- [9] Moretti R, Torre P, Antonello RM, Cazzato G, Bava A. Depression and Alzheimer's disease: symptom or comorbidity? Am J Alzheimers Dis Other Demen 2002; 17(6): 338-44.
- [10] Bassiony MM, Warren A, Rosenblatt A, Baker A, Steinberg M, Steele CD, et al. The relationship between delusions and depression

- in Alzheimer's disease. *Int J Geriatr Psychiatry* 2002; 17(6): 549-56.
- [11] Espiritu DA, Rashid H, Mast BT, Fitzgerald J, Steinberg J, Lichtenberg PA. Depression, cognitive impairment and function in Alzheimer's disease. *Int J Geriatr Psychiatry* 2001; 16(11): 1098-103.
- [12] Takechi H, Yamada H, Sugihara Y, Kita T.

 Behavioral and psychological symptoms,
 cognitive impairment and caregiver burden
 related to Alzheimer's disease patients treated in
 an outpatient memory clinic. *Nippon Ronen Igakkai Zasshi* 2006; 43(2): 207-16.
- [13] Mahoney R, Regan C, Katona C, Livingston G. Anxiety and depression in family caregivers of people with Alzheimer disease: the LASER-AD study. Am J Geriatr Psychiatry 2005; 13(9): 795-801.
- [14] Aguglia E, Onor ML, Trevisiol M, Negro C, Saina M, Maso E. Stress in the caregivers of Alzheimer's patients: an experimental investigation in Italy. Am J Alzheimers Dis Other Demen 2004; 19(4): 248-52.

- [15] Crow TJ, Cross AJ, Cooper SJ, Deakin JF,
 Ferrier IN, Johnson JA, et al. Neurotransmitter
 receptors and monoamine metabolites in the
 brains of patients with Alzheimer-type dementia
 and depression, and suicides.

 Neuropharmacology 1984; 23(12B): 1561-9.
- [16] Suh GH, Kil Yeon B, Shah A, Lee JY.
 Mortality in Alzheimer's disease: a comparative prospective Korean study in the community and nursing homes. *Int J Geriatr Psychiatry* 2005; 20(1): 26-34.
- [17] Arfken CL, Lichtenberg PA, Tancer ME.
 Cognitive impairment and depression predict
 mortality in medically ill older adults. J
 Gerontol A Biol Sci Med Sci 1999; 54(3): 152-6.
- [18] Kaup BA, Loreck D, Gruber-Baldini AL, German P, Menon AS, Zimmerman S, et al. Depression and its relationship to function and medical status, by dementia status, in nursing home admissions. *Am J Geriatr Psychiatry* 2007; 15(5): 438-42.
- [19] Godin O, Dufouil C, Ritchie K, Dartigues JF, Tzourio C, Peres K, et al. Depressive symptoms, major depressive episode and cognition in the

- elderly: the three-city study. *Neuroepidemiology* 2007; 28(2): 101-8.
- [20] Cannon-Spoor HE, Levy JA, Zubenko GS, Zubenko WW, Cohen RM, Mirza N, et al. Effects of previous major depressive illness on cognition in Alzheimer disease patients. Am J Geriatr Psychiatry 2005; 13(4): 312-8.
- [21] de Vasconcelos Cunha UG, Lopes Rocha F, Avila de Melo R, Alves Valle E, de Souza Neto JJ, Mendes Brega R, et al. A placebo-controlled double-blind randomized study of venlafaxine in the treatment of depression in dementia. *Dement Geriatr Cogn Disord* 2007; 24(1): 36-41.
- [22] Alexopoulos GS, Jeste DV, Chung H, Carpenter D, Ross R, Docherty JP. The expert consensus guideline series. Treatment of dementia and its behavioral disturbances. Introduction: methods, commentary, and summary. *Postgrad Med* 2005; Spec No: 6-22.
- [23] Kessing LV, Harhoff M, Andersen PK.
 Treatment with antidepressants in patients with dementia a nationwide register-based study.
 Int Psychogeriatr 2006; 19(5): 902-13.

- [24] Stoudemire A, Hill CD, Morris R, Martino-Saltzman D, Markwalter H, Lewison B. Cognitive outcome following tricyclic and electroconvulsive treatment of major depression in the elderly. *Am J Psychiatry* 1991; 148(10): 1336-40.
- [25] Teri L, Reifler BV, Veith RC, Barnes R, White E, McLean P, et al. Imipramine in the treatment of depressed Alzheimer's patients: impact on cognition. *J Gerontol* 1991; 46(6): 372-7.
- [26] Nair NP, Amin M, Schwartz G, Dastoor D, Thavundayil JX, Mirmiran J, et al. A comparison of the cardiac safety and therapeutic efficacy of trimipramine versus doxepin in geriatric depressed patients. *J Am Geriatr Soc* 1993; 41(8): 863-7.
- [27] Gareri P, De Fazio P, Cotroneo A, Lacava R, Gallelli L, De Fazio S, et al. Anticholinergic drug-induced delirium in an elderly Alzheimer's dementia patient. *Arch Gerontol Geriatr* 2007; 44 Suppl 1: 199-206.
- [28] Lazarus LW, Davis JM, Dysken MW.

 Geriatric depression: a guide to successful therapy. *Geriatrics* 1985; 40(6): 43.

- [29] Lyketsos CG, DelCampo L, Steinberg M, Miles Q, Steele CD, Munro C, et al. Treating depression in Alzheimer disease: efficacy and safety of sertraline therapy, and the benefits of depression reduction: the DIADS. *Arch Gen Psychiatry* 2003; 60(7): 737-46.
- [30] Lebert F. [Serotonin reuptake inhibitors in depression of Alzheimer's disease and other dementias]. *Presse Med* 2003; 32(25): 1181-6.
- [31] Dording CM, Mischoulon D, Petersen TJ, Kornbluh R, Gordon J, Nierenberg AA, et al. The pharmacologic management of SSRIinduced side effects: a survey of psychiatrists. Ann Clin Psychiatry 2002; 14(3): 143-7.
- [32] Clarfield AM. Review: Sedative hypnotics increase adverse effects more than they improve sleep quality in older persons with insomnia. *Evid Based Med* 2006; 11(4): 110.
- [33] Peri K. Review: sedative hypnotics may improve sleep quality but increase adverse effects in elderly people with insomnia. *Evid Based Nurs* 2006; 9(3): 87.

- [34] Lichtenberg PA, Marcopulos BA, Steiner DA,
 Tabscott JA. Comparison of the Hamilton
 Depression Rating Scale and the Geriatric
 Depression Scale: detection of depression in
 dementia patients. *Psychol Rep* 1992; 70(2):
 515-21.
- [35] Teresi JA. Mini-Mental State Examination (MMSE): scaling the MMSE using item response theory (IRT). *J Clin Epidemiol* 2007; 60(3): 256-9.
- [36] Korner A, Lauritzen L, Abelskov K, Gulmann N, Marie Brodersen A, Wedervang-Jensen T, et al. The Geriatric Depression Scale and the Cornell Scale for Depression in Dementia. A validity study. *Nord J Psychiatry* 2006; 60(5): 360-4.
- [37] Devanand DP, Pelton GH, Marston K, Camacho Y, Roose SP, Stern Y, et al. Sertraline treatment of elderly patients with depression and cognitive impairment. *Int J Geriatr Psychiatry* 2003; 18(2): 123-30.
- [38] Lyketsos CG, Sheppard JM, Steele CD, Kopunek S, Steinberg M, Baker AS, et al. Randomized, placebo-controlled, double-blind

- clinical trial of sertraline in the treatment of depression complicating Alzheimer's disease: initial results from the Depression in Alzheimer's Disease study. *Am J Psychiatry* 2000; 157(10): 1686-9.
- [39] Magai C, Kennedy G, Cohen CI, Gomberg D.

 A controlled clinical trial of sertraline in the treatment of depression in nursing home patients with late-stage Alzheimer's disease. *Am J Geriatr Psychiatry* 2000; 8(1): 66-74.
- [40] Ancill RJ, Holliday SG. Treatment of depression in the elderly: a Canadian view. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 1990; 14(5): 655-61.
- [41] Bragin V, Chemodanova M, Dzhafarova N, Bragin I, Czerniawski JL, Aliev G. Integrated treatment approach improves cognitive function in demented and clinically depressed patients. Am J Alzheimers Dis Other Demen 2005; 20(1): 21-6.
- [42] Doraiswamy PM, Krishnan KR, Oxman T, Jenkyn LR, Coffey DJ, Burt T, et al. Does antidepressant therapy improve cognition in

elderly depressed patients? *J Gerontol A Biol Sci Med Sci* 2003; 58(12): M1137-44.

- [43] Avila R, Bottino CM, Carvalho IA, Santos CB, Seral C, Miotto EC. Neuropsychological rehabilitation of memory deficits and activities of daily living in patients with Alzheimer's disease: a pilot study. *Braz J Med Biol Res* 2004; 37(11): 1721-9.
- [44] Schultz SK, Ellingrod VL, Moser DJ,

 Kutschner E, Turvey C, Arndt S. The influence
 of cognitive impairment and psychiatric

- symptoms on daily functioning in nursing facilities: a longitudinal study. *Ann Clin Psychiatry* 2002; 14(4): 209-13.
- [45] Petrovic M, De Paepe P, Van Bortel L. Pharmacotherapy of depression in old age. *Acta Clin Belg* 2005; 60(3): 150-6.
- [46] Edwards JG, Anderson I. Systematic review and guide to selection of selective serotonin reuptake inhibitors. *Drugs* 1999; 57(4): 507-33.

Comparison of Desipramine and Sertraline in the Treatment of Depression in Patients Suffering from Alzheimer Disease

N. Mokhber¹, M.R. Azarpazhooh², A. Talaei³

Received: 22/09/07 Sent for Revision: 24/05/08 Received Revised Manuscript: 5/12/09 Accepted: 25/08/10

Background and Objectives: As depression is a common comorbid disorder with Alzheimer disease, it is important to recognize treatments with more effective and less adverse effects. This study has been devised to comparatively evaluate the effects of designamine and sertraline in this patients.

Materials and Methods: In this single blind clinical trial study, during January 2005 to April 2008, 63 outpatients in Ibn-e-Sina and Ghaem University hospitals in Mashhad city (north eastern part of Iran) were randomly allocated to two groups: 29 cases were treated by desipramine and 34 patients were treated with sertraline (both 25mg/day and if needed up to 150 mg/day). Patients were assessed at 2, 4, 8 and 12th week by PDRS, HRDS and MMSE and side effects of medications.

Results: Changes in mood with HRDS and CSDD have shown that sertraline was effective in all weeks (p<0.05). In contrast, desipramine had no therapeutic effect except in the 12th week according to HRDS scale (p<0.05). Differences between the groups were significant (p=0.02). Differences between daily activating scales regarding PDRS in 8th and 12th week in desipramine group were statistically meaningful (p<0.05), but not in the sertraline group and between the two groups. Also, cognitive changes by MMSE were not significant in the two groups and between the two groups.

Conclusion: Sertraline is more effective than desipramine in the treatment of depression in patients who suffer from alzheimer disease, but they are ineffective on cognitive problems.

Key words: Alzheimer, Dementia, Depression, Sertraline, Desipramine

Funding: This research was funded by Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center of Mashhad University of Medical Sciences.

Conflict of interest: None Declared.

Ethical approval: The Ethics Committee of Mashhad University of Medical Sciences approved the study.

¹⁻ Associate Prof., Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

²⁻ Associate Prof., Dept. of Neurology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

³⁻ Assistant Prof., Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

Corresponding autor, Tel: (0511) 7112722, Fax: (0511) 7112723, E-mail: talaeia@mums.ac.ir