

گزارش کوتاه

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دوره ۱۹، فروردین ۱۳۹۹

مقایسه دو شیوه تمرینی شخصی سازی شده کم حجم- شدید و ترکیبی (قدرتی-هوایی) بر سطوح سرمی پروتئین شبه آنژیوپوئیتین-۴ در زنان مبتلا به دیابت نوع دو دارای اضافه وزن: یک گزارش کوتاه

مرضیه کرمی^۱، مهدی غفاری^۲، ابراهیم بنی طالبی^۳

دریافت مقاله: ۹۶/۰۳/۲۰؛ ارسال مقاله به نویسنده جهت اصلاح: ۹۶/۰۴/۱۹؛ دریافت اصلاحیه از نویسنده: ۹۹/۰۱/۰۶؛ پذیرش مقاله: ۹۹/۰۱/۰۶

چکیده

زمینه و هدف: ANGPTL4 یک پروتئین پیام‌رسان است که در تنظیم متابولیسم گلوكز و چربی نقش دارد. این پژوهش با هدف تعیین و مقایسه دو شیوه تمرینی شخصی‌سازی شده کم حجم- شدید و ترکیبی (قدرتی-هوایی) بر سطوح سرمی پروتئین شبه آنژیوپوئیتین-۴ (ANGPTL4) در زنان مبتلا به دیابت نوع دو است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، تعداد ۴۲ نفر از زنان دیابتی دارای اضافه وزن شهرستان شهرکرد مراجعه کننده به کلینیک پارس به طور تصادفی در سه گروه تمرین کم حجم- شدید، تمرین ترکیبی قدرتی- هوایی و کنترل قرار گرفتند. هشت هفته تمرین انجام شد. جهت آنالیز داده‌ها از آزمون t زوجی و روش آماری تحلیل واریانس استفاده گردید.

یافته‌ها: بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون اختلاف سطوح ANGPTL4 معنی‌داری وجود ندارد ($p > 0.05$).

نتیجه‌گیری: عدم تغییر معنی‌دار در سطوح سرمی ANGPTL4 به دنبال دو شیوه تمرینی مذکور در زنان مبتلا به دیابت نوع دو احتمالاً به دلیل کوتاه بودن طول دوره، سن آزمودنی‌ها و سطح آمادگی آن‌ها بوده است.

واژه‌های کلیدی: دیابت نوع دو، ANGPTL4، تمرین کم حجم با شدت بالا، تمرین ترکیبی قدرتی-هوایی ، زنان، اضافه وزن

۱- کارشناس ارشد، فیزیولوژی ورزش، گروه علوم ورزشی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

۲- (نویسنده مسئول) استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

تلفن: ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۱۱، دورنگار: ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۱۱، پست الکترونیکی: ghafari.mehdi@gmail.com

۳- دانشیار گروه تربیت بدنی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

شواهد اخیر نشان می‌دهد که تمرینات با حجم کمتر و شدت بالا می‌تواند آثار مثبت یا حتی بیشتری جهت پیشگیری از خطر بیماری نسبت به تمرینات تداومی ایجاد نماید. همان‌طور که به طور جداگانه فرض دیگر سؤال تحقیقی است که به‌وسیله Sigal و همکاران (۲۰۰۷) [۵] مورد بررسی قرار گرفته است. تمرینات تناوبی خیلی شدید اثرات سودمندی در ارتباط با سلامتی از قبیل سلامت قلبی-عروقی و کاهش چربی که عمدت‌ترین دلیل افراد برای شرکت در یک برنامه ورزش در اولین نگاه هستند را دارا است [۶]. به نظر می‌رسد برخی از پروتکل‌های HIIT مثلاً ۴ و هله ۳۰ ثانیه با تمام قوا که به عنوان تمرین تناوبی سرعتی شدید می‌باشند نزدیک به مداخلات تمرین مقاومتی است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که از یک طرف تمرینات اینتروال با شدت بیشینه (SIIT) می‌تواند منجر به تحريك مکانیکی نسبتاً شدید گردد، درحالی که از طرف دیگر این نوع تمرین می‌تواند منجر به تحريك متابولیکی بالا گردد [۷].

اما از انجایی که دو شیوه مؤثر تمرین بر ANGPTL4 انجام نشده است. با توجه به موارد توضیح داده شده و نیز خلاصه علمی هدف از این تحقیق تعیین و مقایسه دو شیوه تمرینی شخصی‌سازی شده کم حجم- شدید و ترکیبی (قدرتی-هوایی) بر سطوح سرمی پروتئین ANGPTL4 در زنان مبتلا به دیابت نوع دو است.

مواد و روش‌ها

مقدمه

ANGPTL4 یک پروتئین پیام‌رسان با عملکردهای مختلف است که توسط بیشتر بافت‌ها ساخته می‌شود. این پروتئین در تنظیم آنزیوژن، متابولیسم گلوکز و چربی و تمایز سلولی درگیر است و باعث کاهش بیان ژن‌های التهابی و استرس سلولی می‌گردد و یک عامل مهم در محافظت از بدن علیه تأثیرات شدید التهابی است [۱]. مطالعات مختلفی نشان داده است که ANGPTL4 فعالیت لیپوپروتئین لیپاز (lipoprotein lipase; LPL) که مسئول هیدرولیز تری‌گلیسرید پلاسمایده را مهار می‌کند. این فاکتور هم‌چنین لیپولیز بافت چرب را تحریک کرده و منجر به رهایش گلیسرول و اسیدهای چرب آزاد (FFAs) به گردش خون می‌شود. ۴ هم‌چنین ANGPTL4 رابطه مثبت و معنی‌داری با توده چربی بدن دارد. PPAR- γ اغلب به عنوان FIAF پروتئین مرتبط با Angiopoietin-related protein Hepatic (/ آنزیوپویتین کبدی (fibrinogen/angiopoietin-related protein) شناخته می‌شود [۲]. Kersten و همکاران گزارش کردند که سطوح ANGPTL4 پلاسمای در انسان به طور قابل توجهی در پاسخ به حالت ناشتا بلند مدت، محدودیت کالری مزمن و تمرین استقامتی افزایش یافته است. همه این وضعیت‌ها توسط افزایش گردش اسید چرب آزاد مشخص شده است [۳]. هم‌چنین، Kim و همکاران (۲۰۱۳) نشان دادند که ANGPTL4 یک فاکتور مؤثر در تغییرات ناشی از ورزش در فعال سازی آدنوزین مونو فسفات کیناز (AMPK) است [۴].

اخلاق از دانشگاه به شماره ثبتی SKU94/210 می‌باشد. در پایان ۴۲ نفر از آزمودنی‌ها موفق به اتمام دوره تحقیق شدند و ۱۰ نفر به علت بیماری و عدم شرکت در تمرین حذف شدند. ۲۴ ساعت قبل از شروع تمرینات و ۴۸ ساعت بعد از اتمام آخرین جلسه تمرینی نمونه خونی در شرایط یکسان از آن‌ها گرفته شد.

دوره تمرینی حاضر، طی هشت هفته و هر هفته سه جلسه به طول انجامید. گروه تمرینی ترکیبی دو جلسه در هفته تمرین مقاومتی با ۷۰ درصد یک تکرار بیشینه و تمرین هوایی با ۶۰ تا ۷۰ درصد حداکثر ضربان قلب و یک جلسه در هفته فقط تمرین هوایی انجام دادند (درمجموع سه جلسه در هفته). گروه تمرینی ترکیبی در ابتدا برنامه تمرین قدرتی را انجام می‌دادند و پس از پنج دقیقه استراحت برنامه تمرین هوایی را انجام می‌دادند، به منظور شخصی سازی کردن تمرین، چنانچه شخص می‌توانست در یک جلسه، سه ست موردنظر در تمرین قدرتی را با هشت تکرار بیشتر، یعنی ۲۰ تکرار تمام کند، به اندازه ۲/۵ تا ۵ کیلوگرم به وزنه مورد نظر اضافه می‌شد. در تمرین هوایی چنانچه فرد دو جلسه پیاپی می‌توانست تمرین را با همان شدت توصیه شده انجام دهد ۵-۱۰ درصد بر میزان درصد ضربان قلبی که فعالیت در آن انجام می‌گرفت، اضافه می‌شد. در گروه کم حجم-شدید تمرین اصلی شامل ۴-۱۰ تکرار آزمون وینگیت ۳۰ ثانیه‌ای بر روی ارگومتر با تلاش حداقل بود، افراد در این گروه یک فعالیت رکاب زنی در آزمون وینگیت ۳۰ ثانیه‌ای با مقاومت معادل ۷/۵ درصد وزن بدن خود را انجام دادند. تعداد اجراهای آزمون وینگیت در طی هر هفته تمرینی افزایش پیدا کرد و چنانچه آزمودنی می‌توانست

این تحقیق از نوع کار آزمایی بالینی با کد ثبتی IRCT20141118019995N10 هماهنگی‌های اولیه با مراکز انجمن دیابت و اطلاع‌هایی که در سطح شهرستان شهرکرد برای اطلاع‌رسانی پخش گردید، نمونه‌گیری به صورت آسان و با توجه میزان اندازه اثر ۸۰ درصد پیش‌بینی شده و میزان ریزش ۲۰ درصد آزمودنی‌ها و نیز مقایسه دو گروه تمرینی SIT و ترکیبی تعداد ۱۷ نفر زن دارای اضافه وزن در هر گروه تعیین گردید و از افراد واحد شرایط برای شرکت در تحقیق دعوت به عمل آمد که از بین افراد مراجعه‌کننده به کلینیک پارس شهرکرد، ۵۲ زن دیابتی نوع ۲ با دامنه سنی ۴۵ تا ۶۰ سال و قند خون ناشتاًی بالاتر از ۱۲۶ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (طبق شاخص‌های انجمن دیابت آمریکا) که دارای هموگلوبین A1c بالاتر و مساوی ۶/۵ درصد (طبق شاخص‌های انجمن دیابت آمریکا) و شاخص توده بدنی ۲۵ تا ۳۰ کیلوگرم بر مترمربع بودند انتخاب شدند. ۲۷ نفر از آزمودنی‌ها قرص مصرف می‌کردند، ۲۰ نفر انسولین تزریق می‌کردند و ۵ نفر آن‌ها انسولین و قرص مصرف می‌کردند. بر اساس شاخص هموگلوبین A1c در سه گروه تمرین ترکیبی (۱۷ نفر)، تمرین کم حجم-شدید (۱۷ نفر) و کنترل (۱۸ نفر) قرار گرفتند. آزمودنی‌ها فرم رضایت‌نامه، پرسشنامه سابقه پزشکی، پرسشنامه آمادگی برای شروع فعالیت بدنی پر کردند و سابقه هیچ‌گونه بیماری قلبی عروقی، مفصلی و عصبی عضلانی، زخم پای دیابتی و نفروپاتی نداشتند. ابتدا طی یک جلسه داوطلبان با نوع طرح، اهداف و روش اجرای آن به طور شفاهی آشنا شدند. به داوطلبان اطمینان داده شد که اطلاعات دریافتی از ایشان کاملاً محرمانه خواهد ماند. علاوه بر این کد

$X =$ مجموعه ضخامت چربی زیرپوستی سه نقطه ران، فوق خاصره و سه سر بازو برحسب میلی‌متر است.

برای اندازه‌گیری ضخامت چربی زیرپوستی از کالیپر لافایت مدل ۱۱۲۸ ساخت کشور آمریکا استفاده شد که دقت اندازه‌گیری آن 0.1 میلی‌متر بود.

اندازه‌گیری شاخص‌های بیوشیمیایی

سطح ANGPTL4 سرمی به روش ELISA با استفاده از کیت BOSTER ساخت کشور آمریکا اندازه‌گیری شد. سطح گلوکز سرمی به روش ELISA با استفاده از کیت Pars ساخت کشور ایران اندازه‌گیری شد. سطح انسولین سرمی به روش ELISA با استفاده از کیت Diaplus ساخت کشور آمریکا اندازه‌گیری شد. برای محاسبه مقاومت به انسولین از فرمول شاخص مقاومت به انسولین HOMA-IR استفاده گردید.

$$\text{HOMA-IR} = \frac{\text{گلوکز ناشتا سرم (میلی گرم)}}{\text{انسولین ناشتا سرم (میلی واحد بر میلی لیتر)}} \times 22.5 \times 18$$

جهت توصیف داده‌ها از میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق استفاده شد. هم‌چنین برای ارزیابی طبیعی بودن توزیع داده‌ها از آزمون کولموگروف اسمیرونوف استفاده شد و جهت تعیین تفاوت‌های درون‌گروهی از آزمون t زوجی و جهت تعیین تفاوت‌های میان‌گروه‌ها از روش آماری تحلیل واریانس استفاده گردید. تمامی محاسبات آماری با نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۷ و سطح معنی‌داری آزمون‌ها 0.05 انجام گرفت.

نتایج

در دو جلسه متوالی سه تکرار را با سرعت و بار تعیین شده انجام دهد، 10 درصد به مقدار بار اضافه شد. زمان ریکاوری بین هر تکرار، چهار دقیقه استراحت غیرفعال در نظر گرفته شد. زمان کل فعالیت برای این شیوه تمرینی 20 تا 40 دقیقه در نظر گرفته شد. گروه کنترل در هیچ فعالیت منظمی شرکت نداشتند.

آزمودنی‌ها در دو مرحله، در ابتدای مطالعه و پس از هشت هفته در محل کلینیک حاضر شده، وزن، قد و شاخص توده بدن آن‌ها اندازه‌گیری شد.

برای برآورد حداکثر قدرت: ابتدا آزمودنی با انتخاب وزنه‌های بسیار سبک خود را گرم کرده و سپس طبق برآورد خود آزمودنی وزنه‌ای انتخاب شد که آزمودنی بتواند حداقل یکبار و حداکثر 10 بار آن را به صورت کامل و صحیح بلند کند. با جایگذاری مقدار وزنه و تعداد تکرارها در فرمول زیر، قدرت بیشینه آزمودنی در هر حرکت به دست آمد.

$$\text{تعداد تکرارها} \times \text{خستگی} \times 0.278 - 0.278 / 0.278 = \{1 / 0.278\}$$

مقدار وزنه به کیلوگرم = $1RM$
 درصد چربی: با استفاده از کالیپر ضخامت چربی زیرپوستی این نقاط اندازه‌گیری شد. ضخامت چربی هر نقطه سه مرتبه به صورت چرخشی اندازه‌گیری شد و میانگین آن در فرمول استفاده گردید [۸].

$$(\text{سن} ۱۳۹۲ + ۰.۰۰۰۰۰۲۳(\text{x}^2)) - ۰.۰۰۰۱۳۹۲ = \text{چگالی بدن}$$

$$= ۰.۹۹۴۹۲۱ - ۰.۰۰۰۹۹۲۹(\text{x})$$

$$= \text{درصد} (\text{BF}(4/95) - 4/5) \div 100$$

چربی

داده‌های گلوكز، انسولین سرم و شاخص مقاومت به انسولین آزمودنی‌ها در جدول ۱ نشان داده شده است.

جدول ۱- مقایسه تأثیر مداخله‌های ورزشی بر تغییرات درون‌گروهی و میان‌گروهی زنان دیابتی دارای اختلاف وزن شهرستان شهرکرد ($n=42$)

P	F	کنترل		تمرین ترکیبی		کم حجم-شدید		متغیر	
		انحراف معیار \pm		انحراف معیار \pm		انحراف معیار \pm			
		میانگین	میانگین	میانگین	میانگین	میانگین	میانگین		
۰/۹۸۲	۰/۰۱۹	۱۶۵/۳۷ \pm ۲۹/۴۸		۱۹۱/۴۵ \pm ۲۸/۴۴		۲۰۳/۰۳ \pm ۵۳/۲۸		پیش‌آزمون	
		۱۹۹/۰۴ \pm ۵۸/۷۳۴۹		۱۹۹/۸۸ \pm ۳۵/۳۹		۱۹۶/۷۷ \pm ۴۷/۴۶		پس‌آزمون آنژیوبوئیتین	
		-۱/۸۴۹		-۰/۸۴۹		۰/۳۲۳		t درون‌گروهی	
		۰/۰۸۷		۰/۴۱۱		۰/۷۵۱		p ارزش	
		۱۷۷/۲۸ \pm ۴۷/۰۹		۲۱۶ \pm ۶۳/۰۸		۲۱۰/۰۷ \pm ۳۲/۹۰		پیش‌آزمون	
		۱۸۳/۲۸ \pm ۶۰/۷۰		۱۶۳/۸۵ \pm ۷۱/۴۷		۱۴۷/۹۲ \pm ۴۱/۱۷		پس‌آزمون	
۰/۱۷۱	۱/۸۵۳	-۰/۴۰۸		۲/۰۴		۵/۳۴		گلوكز ناشتا	
		۰/۶۹۰		۰/۰۶۲		<۰/۰۰۱		t درون‌گروهی	
		۶/۵۸ \pm ۱/۶۱		۹/۱۰ \pm ۲/۶۲		۷/۷۲ \pm ۲/۶۳		پیش‌آزمون	
		۶/۲۱ \pm ۲/۰۶		۵/۹۳ \pm ۲/۲۴		۴/۹۶ \pm ۱/۳۰		پس‌آزمون	
		۰/۹۱۲		۴/۳۱		۴/۹۵		t درون‌گروهی	
		۰/۳۷۸		۰/۰۰۱		<۰/۰۰۱		p ارزش	
۰/۰۳۶	۳/۶۲۲	۲/۸۸ \pm ۱/۰۳		۴/۸۸ \pm ۱/۶۱		۳/۸۷ \pm ۱/۲۵		پیش‌آزمون	
		۲/۷۷ \pm ۱/۱۸		۲/۳۶ \pm ۱/۱۳		۱/۶۳ \pm ۰/۴۳		پس‌آزمون مقاومت به	
		۰/۳۵۰		۴/۶۵		۷/۳۱		t درون‌گروهی	
		۰/۷۳۲		<۰/۰۰۱		<۰/۰۰۱		p ارزش	
								انسولین	

آنالیز: واریانس یک طرف $p < 0.05$ * به عنوان رابطه معنی‌دار

نیود (۰/۱۷۱). انسولین سرم و مقاومت به انسولین در هر دو گروه تمرینی کاهش معنی‌داری یافتند (به ترتیب $P < 0.001$ و $P = 0.001$ ؛ که نتایج بین‌گروهی معنی‌دار

در مقایسه بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون، گلوكز ناشتا به دنبال انجام تمرین ترکیبی غیر معنی‌دار و در گروه کم حجم-شدید معنی‌دار بود ($0.1 < p < 0.001$)، اما در تغییرات بین‌گروهی معنی‌دار

طولانی مدت تمرین ورزشی و سه ماه به عنوان یک دوره کوتاه‌مدت برای تغییرات در سطح بیولوژیکی مولکولی نشان داده شده است [۹]. نشان داده شده است که بین سطوح اسیدهای چرب آزاد و ANGPTL4 ارتباط وجود دارد. مطالعه‌ای نقش ANGPTL4 در هموستاز لیپید و آزادسازی از اسید چرب آزاد سرم از طریق تنظیم لیپاز لیپوپروتئین بررسی کرده است. در مطالعه‌ما، تغییرات غیرمعنی‌داری در غلظت ANGPTL4 سرم به همراه تغییرات غیرمعنی‌داری در اسید چرب آزاد سرم به دنبال ۸ هفته تمرین کم حجم-شدید و ترکیبی دیده شد [۱۰].

نتایج در مطالعه حاضر نشان داد که مقدار پایه، انسولین سرم و شاخص مقاومت به انسولین بعد از ۸ هفته تمرین شدید اینتروال و تمرین ترکیبی در زنان دیابتی مقایسه شد. این مطالعه بیان می‌کند که برنامه تمرین شدید اینتروال و تمرین ترکیبی سه روز در هفته به مدت ده هفته اطمینان‌بخش بود و توسط بیماران با دیابت نوع دو قابل تحمل بود و در بهبود سطوح انسولین سرم و شاخص مقاومت به انسولین مؤثر بود. یافته‌های ذکر شده بالا به نظر می‌رسد با نتایج مطالعاتی که تمرین با شدت بالا همراه با بهبود کنترل هیپو گلیسمی در افراد چاق و یا بیماران مبتلا به دیابت نوع دو یافت شد هم خوانی دارد.

به نظر می‌رسد که بیماران با دیابت نوع دو پاسخ کاملاً متفاوتی به تمرین کم حجم-شدید و تمرین ترکیبی دارند. مکانیزم‌هایی برای بهبود در آدیپومایوکاین‌های مشاهده شده بعد از تمرین کم حجم-شدید و تمرین ترکیبی در مطالعه

تفاوت معنی‌دار بین گروه کم حجم-شدید و کنترل در فاکتور انسولین و مقاومت به انسولین بود (به ترتیب $P=0.036$ و $P=0.008$). همان‌طور که در جدول ۱ مشاهده می‌شود مقدار ANGPTL4 در گروه کم حجم-شدید ($P=0.751$) و ترکیبی ($P=0.411$) پس از هشت هفته تمرین افزایش یافته اما با توجه به مقادیر P بین گروهی معنی‌دار نبود ($P=0.982$). در ANGPTL4 پس از هشت هفته تمرین گروه کنترل مقدار کاهش غیرمعنی‌داری را نشان می‌دهد ($P=0.087$). کاهش گلوکز ناشتا به دنبال انجام تمرین ترکیبی غیر معنی‌دار و در گروه کم حجم-شدید معنی‌دار بود هم‌چنین در گروه کنترل کاهش غیر معنی‌داری در گلوکز ناشتا مشاهده نشد. انسولین سرم و مقاومت به انسولین در هر دو گروه تمرینی کاهش معنی‌داری یافتند؛ که نتایج بین گروهی نشان دهنده تفاوت معنی‌دار بین گروه تمرین کم حجم-شدید و کنترل در فاکتور انسولین و مقاومت به انسولین بود.

بحث

در این تحقیق مشاهده شد که به دنبال هشت هفته تمرینات کم حجم-شدید و تمرینات ترکیبی میزان ANGPTL4 پس‌آزمون در دو گروه نسبت به پیش آزمون کاهش معنی‌داری نداشت. هم‌چنین در نتایج بین گروهی، بین گروه تمرین کم حجم-شدید و ترکیبی و کنترل تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.

دوایزه هفته تمرین کم حجم-شدید و تمرین ترکیبی تأثیری بر سطوح استراحتی ANGPTL4 نداشت. احتمالاً بعضی از سازگاری‌های فیزیولوژیکی تنها بعد از یک دوره

نتیجه‌گیری

نتایج این تحقیق نشان داد که دو شیوه تمرینی تأثیر یکسانی بر شاخص‌های مرتبط با مقاومت به انسولین به یک اندازه مؤثر بودند. هر دو تمرین در بهبود مقاومت به انسولین و ANGPTL4 به یک اندازه مؤثر بودند، لذا احتمالاً استفاده از نوع تمرینات کم حجم-شدید و تمرین ترکیبی می‌تواند در بهبود مقاومت به انسولین به یک اندازه مؤثر و مفید باشد، لذا استفاده از این دو نوع تمرین می‌تواند به جای یکدیگر در این افراد دارای مزایای یکسان است و افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ با توجه به کمبود زمان و نیز مشکلات پس از تمرینات طولانی مدت می‌توانند از تمرینات کم حجم با شدت بالا بجای تمرینات توصیه شده استاندارد (ترکیبی قدرتی-استقامتی) استفاده نمایند. با توجه به عدم تفاوت‌های معنی‌دار در فاکتورهای موردنظر، پیشنهاد می‌شود که تحقیقات بیشتر با دوره‌های طولانی‌تر و کنترل بهتر تغذیه و دیگر مایوکاین‌های مرتبط با مقاومت به انسولین انجام گیرد.

تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان از کلیه آزمودنی‌های این تحقیق و مدیریت مرکز توابخشی پارس شهرکرد کمال تشکر را دارد.

حاضر روشن نیست. اظهارات بیان می‌کند که بهبود سطوح آدیپومایوکاین سرم بعد از تمرین کم حجم-شدید و تمرین ترکیبی با مکانیزم‌های از تمرین هوازی و مقاومتی متفاوت است. احتمال دارد که تمرین کم حجم-شدید و تمرین ترکیبی بافت چربی زیر شکمی را تحریک می‌کند که می‌تواند توسط کاهش سطوح آدیپومایوکاین سرم توضیح داده شود [۱۱]. مکانیسم تمرین کم حجم-شدید با بهبود غلظت آدیپومایوکاین در توانایی فعال کردن پروکسی زوم فعال (PGC-1 α) ارتباط دارد. مطالعات بیان می‌کند که تمرین شدید فاکتور اصلی تأثیرگذار بر فعال‌سازی PGC-1 α است [۱۲]. به نظر می‌رسد که مسیر سیگنالینگ PGC-1 α توسط گذرگاه سیگنالینگ بزرگ اثر کند. مطالعات قبلی نشان می‌دهد که بیان PGC-1 α در فیبر عضلات اسکلتی نوع IIa نسبت به فیبر نوع I/IIx و سه بزرگتر است [۱۳]؛ بنابراین، چندین مطالعه تغییرات فیبرهای عضلانی نوع I و IIa بعد از تمرین شدید اینتروال توضیح داده شده است [۱۴]. کاهش معنی‌داری در آدیپومایوکاین مرتبط با ANGPTL4، انسولین، FBG و شاخص مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو اشاره به اهمیت بالینی دارد. در کل، این دو نوع تمرین ممکن است پتانسیلی برای بهبود شاخص گلیسمی و آدیپومایوکاین‌های مرتبط با مقاومت به انسولین داشته باشد.

References

- [1] Guo, L., et al., Role of Angptl4 in vascular permeability and inflammation. *Inflammation Research* 2014; 63(1): p. 13-22.
- [2] Grootaert, C., et al., *Angiopoietin-like protein 4: health effects, modulating agents and structure-function relationships*. *Expert review of proteomics* 2012; 9(2): p. 181-99.
- [3] Kersten, S., et al., Caloric restriction and exercise increase plasma ANGPTL4 levels in humans via elevated free fatty acids. *Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology* 2009; 29(6): p. 969-74.
- [4] Kim, M.-S., et al., Physiological role for Angptl4/fiaf in exercise-induced muscle AMPK activation. *J Sports Med Doping Stud* 2013; 9(2): p. 18-9.
- [5] Sigal, R.J., et al., Effects of aerobic training, resistance training, or both on glycemic control in type 2 diabetes: a randomized trial. *Annals of Internal Medicine* 2007; 147(6): p. 357-69.
- [6] Gibala, M.J., High-intensity interval training: a time-efficient strategy for health promotion? *Current sports Medicine Reports* 2007; 6(4): p. 211-13.
- [7] Wahl, P., Hormonal and metabolic responses to high intensity interval training. *Journal of Sports Medicine & Doping Studies* 2013; 3(1), p.e132.
- [8] Jackson, P., D.T. Smith, and P. Stanford, Resistivity-porosity-particle shape relationships for marine sands. *Geophysics* 1978; 43(6): p: 1250-68.
- [9] Kim, K.B., Effect of different training mode on Interleukin-6 (IL-6) and C-reactive protein (CRP) in type 2 diabetes mellitus (T2DM) patients. *Journal of Exercise Nutrition & Biochemistry* 2014; 18(4): p. 371.
- [10] Yoshida, K., et al., Angiopoietin-like protein 4 is a potent hyperlipidemia-inducing factor in mice and inhibitor of lipoprotein lipase. *Journal of Lipid Research* 2002; 43(11): p. 1770-72.
- [11] Raschke, S. and J.r. Eckel, Adipo-myokines: two sides of the same coinâ€”mediators of inflammation and mediators of exercise. *Mediators of Inflammation* 2013.
- [12] Schnyder, S. and C. Handschin, Skeletal muscle as an endocrine organ: PGC-1 α , myokines and exercise 2015. *Bone* 80: p. 115-25.
- [13] Russell, A.P., et al., Endurance training in humans leads to fiber type-specific increases in levels of peroxisome proliferator-activated receptor- γ coactivator-1 and peroxisome proliferator-activated receptor- α in skeletal muscle. *Diabetes* 2003; 52(12): p: 2874-81.
- [14] Scribbans, T.D., et al., Fibre-specific responses to endurance and low volume high intensity interval

training: striking similarities in acute and chronic adaptation. *PLoS One*. 9(6): p. e98119.

Comparison of the Effect of Two Personalized Low Volume-High Intensity and Combined (Strength-Aerobic) Exercises on Angiopoietin-like Protein 4 (ANGPTL4) Serum Levels in Women with Type 2 Diabetes: A Short Report

M. Karami¹, M. Ghafari², E. Banitalebi³

Received:23/05/17 Sent for Revision: 10/07/17 Received Revised Manuscript:24/03/2020 Accepted: 25/03/2020

Background and Objectives: ANGPTL4 is a messenger protein that plays a role in regulating glucose and lipid metabolism. The aim of this study was to compare the effect of two personalized low volume-high intensity and combined (strength-aerobic) exercises on Angiopoietin-like protein 4 (ANGPTL4) protein serum levels in women with type 2 diabetes.

Materials and Methods: In this clinical trial, 42 overweight diabetic women referred to Pars Clinic in Shahrekord were randomly divided into three groups of low-intensity exercise, combined strength-aerobic exercise, and control. They underwent training for 8 weeks. Data was analyzed using paired t-test and analysis of variance.

Results: There was no significant difference between ANGPTL4 levels in pre-test and post-test ($p>0.05$).

Conclusion: No significant change in ANGPTL4 serum levels following the two mentioned practices in women with type 2 diabetes was probably due to the short duration of the course, the age of the subjects and their level of fitness.

Key words: Type 2 diabetes, ANGPTL4, Low volume–high intensity exercise, Combined strength-aerobic exercise, Women, Overweight

Funding: None declared.

Conflict of interest: None declared.

Ethical approval: The Ethics Committee of University of Shahrekord approved the study (SKU94/210).

How to cite this article: Karami M, Ghafari M, Banitalebi E. Comparison of the Effect of Two Personalized Low Volume-High Intensity and Combined (Strength-Aerobic) Exercises on Angiopoietin-like Protein 4 (ANGPTL4) Serum Levels in Women with Type 2 Diabetes: A Short Report. *J Rafsanjan Univ Med Sci* 2020; 19 (1): 97-106. [Farsi]

1- MSc in Exercise Physiology, Dept. of Sport Sciences, Islamic Azad University, Yasouj Branch, Yasouj, Iran, ORCID: 0000-0001-6709-7829

2- Assistant Prof., Dept. of Sport Sciences, Faculty of Literature & Humanities, University of Shahrekord, Sharekord, Iran,

ORCID: 0000-0002-9943-9747 (Corresponding Author) Tel: (038) 32324401, Fax: (038) 32324411, E-mail: ghafari.mehdi@gmail.com

3- Associate Prof., Dept. of Sport Sciences, Faculty of Literature & Humanities, University of Shahrekord, Sharekord, Iran, ORCID:0000-0002-2691-9846