### مق**اله پژوهشی** مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان جلد سوم، شماره دوم، بهار ۱۳۸۳

# مقایسه اثر دو دوز مختلف سم بوتولیسم در درمان شقاق مزمن مقعد حسن سلمان روغنی ۱\*، سعید کار گر۲، ضیاء بوترایی ۳

#### خلاصه

سابقه و هدف: شقاق مزمن مقعد بیماری شایع ناحیه انورکتال میباشد. بررسیهای مانومتریک افرایش فشار در ناحیه اسفنکتر داخلی مقعد را عامل جلوگیری از بهبودی شقاق میداند. بنابراین درمان بر روی کاهش فشار اسفنکتر مقعد متمرکز شده است. یکی از روشهای درمانی تزریق سم بوتولیسم در اسفکتر مقعد میباشد اما دوز ایدهآل آن هنوز مشخص نشده است. هدف بررسی حاضر مقایسه تأثیر دو دوز مختلف سم بوتولیسم بر روی میزان بهبودی و عوارض درمان میباشد. مواد و روشها: تعداد ۷۰ بیمار مبتلا به شقاق مزمن مقعد که سابقه بیماری بیش از ۳ ماه داشتند و در معاینه مقعد علایم مزمن شدن به صورت پیدایش skin tag و یا دیده شدن فیبرهای عضله داخلی مقعد در کف زخم داشتند وارد مطالعه شدند. بیماران به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند، گروه اول (I) توکسین بوتولیسم ۸۰ واحد و گروه دوم (II) مطالعه شدند. بیماران به مدت یک سال پیگیری شدند. بهبودی علایم و یا پیدایش اسکار ناشی از بهبودی زخم به عنوان پاسخ درمانی مناسب منظور شد.

یافته ها: ۳۸ بیمار مرد و ۳۲ بیمار زن بودند متوسط سنی بیماران ۱۱/۲±۳۵/۳ سال، متوسط طول بیماری ۴/۱۵±۱۰/۰ ماه بود ۸۲/۸۵٪ بیماران شقاق در ناحیه خلفی مقعد داشتند. شایع ترین علامت، درد هنگام دفع مدفوع بود . یک بیمار از گروه با دوز کم و در چهار بیمار از گروه با دوز بالا بی اختیاری اسفنکتر مقعد برای گاز بوجود آمد که در چهار بیمار بیمار بیمار قبل از ۸ هفته بهبودی کامل یافت و هیچ بیماری عارضه دایمی نداشت. ۶۲ بیمار مطالعه را به پایان رسانیدند.

و هر دو گروه ۴ نفر برای پیگیری مراجعه نکردند بعد از یک هفته تنها در گروه دوز بالا (II) ۴بیمار بهبودی شقاق داشتند و هیچ کدام از بیماران گروه دوز کم (I) بهبودی نداشتند. بعد از دو هفته 7٪ بیماران گروه دوز کم (I) بهبودی نداشتند. در پایان ۸ هفته 6٪ بیماران گروه اول و 6٪ بیماران گروه دو بهبودی داشتند. دو بیمار در گروه دوز کم (I) قبل از پایان شش ماه دچار عود سریع شدند ولیکن در گروه دوز بالا (II) هیچ بیمار دچار عود سریع نشد. بعد از پایان مطالعه 6 بیمار از گروه دوز زیاد بهبودی کامل داشتند. بعد از پایان مطالعه، 6 بیمار در گروه دوز زیاد عدم بهبودی داشتند که 6 بیمار در گروه دوز زیاد عدم بهبودی داشتند که 6 بیمار در گروه دو بیمار در گروه دو نیمار در گروه دو دو بیمار در گروه دو تود بیمار در گروه دو تود بیمار در گروه دو تود بیمار در گروه دو عود بیماری داشتند.

نتیجه گیری :به نظر میرسد افزایش دوز توکسین بوتولیسم باعث افزایش پاسخ درمان در بیماران مبتلا به شقاق مقعد می شود این افزایش دوز همراه با عوارض جانبی دایم نیست.

واژههای کلیدی: شقاق مزمن مقعد، سم بوتولیسم، آنور کتال

۱\* - استادیار بخش داخلی و فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (نویسندهٔ مسئول)

۲- استادیار بخش جراحی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

۳- استادیار بخش داخلی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

#### مقدمه

شقاق مقعد یکی از بیماریهای شایع انورکتال است که به دلیل دردناک بودن آن باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای بیماران می شود. در این بیماری یک شکاف در ناحیه کانال آنال بوجود می آید که می تواند تا خط دندانه ای ادامه یابد. به دلیل وجود اعصاب سوماتیک در این محل درد موقع اجابت مزاج از علایم بسیار شایع بیماری میباشد. درد شبانه نیز وجود دارد و گاهی باعث خونریزی می گردد. خارش مقعد و پیدایش ترشح از شکایات بیماران است [۱،۱۵٬۳۰٬۳۵]. اگرچه اتیولوژیهای مختلف برای شقاق مزمن مطرح شده است، اما افزایش فشار اسفنکتر آنال و پیدایش ایسکمی ثانویه به عنوان علت عدم بهبودی زخم و مزمن شدن آن، مورد قبول همگان مى باشد [١٨]. بيماران با شقاق مقعد داراى فشار بالاى اسفنکتر آنال در حال استراحت و عدم شل شدن خودبخود در اسفنکتر آنال در هنگام اجابت مزاج هستند [۱۷٬۳۳٬۳۶]. امروزه دلایل قوی مبنی بر این که اکسیدنیتریک (NO) یک میانجی عصبی شل کننده اسفنکتر داخلی مقعد، می باشد و احتمالاً نيترو گليسيرين موضعي از اين طريق يعني افزايش میزان (NO) باعث کاهش فشار در اسفنکتر آنال می شود [٣٨]؛ اگرچه استفاده از این دارو مؤثر است امـا کـاهش فـشار خون و پیدایش سردرد استفاده از دارو را برای اغلب بیماران غيرقابل تحمل ميسازد، به همين دليل امروزه استفاده از مواد دیگر نظیر مهار کنندههای کانال کلسیم و آنتاگونیستهای گیرنده های الفا-آدرنرژیک، که از عوارض جانبی کمتری برخوردار است توصیه می کنند [۶].

استفاده از سم بوتولیسم برای درمان شقاق مزمن مقعد پیشنهاد شده است. اگرچه تنها در یک مطالعه تأثیر آن با پلاسبو یکسان گزارش شده است [۳۷] اما در اغلب مطالعات کارایی آن اثبات گردیده است. سم بوتولیسم از طریق مهار غیرقابل برگشت رهایش استیل کولین از انتهاهای عصبی پیش سیناپسی در اسفنکتر داخلی مقعد باعث کاهش بارز در فشار اسفنکتر شده است و به این ترتیب به بهبودی و ترمیم زخم کمک می کند [۱۰،۱۱،۱۳،۲۱۲۲]. این اثر کوتاه مدت بوده و حدود ۱۲ هفته طول می کشد [۳۳]، این مدت برای بهبودی شقاق مزمن کافی می باشد و از سال ۱۹۹۳ در درمان شقاق

مزمن مقعد بكار گرفته شده است [۱۶]. ميزان LD50 سم بوتولیسم در انسان حدود pg/kg میباشد و تا کنون موارد مرگ در استفاده از این دارو گزارش نشده است [۸] مشکل عمده در ارتباط با سم بوتولیسم مقدار تزریق آن است زیرا در ۳۰ درصد از بیماران با دوز اول تزریق پاسخ مناسب بوجود نمی آید و نیاز به تزریق دوز دوم داروی بوتولیسم میشود، به نظر میرسد، عدم بهبودی اولیه مربوط به دوز ناکافی دارو باشد [۱۱] پیدایش آنتیبادی علیه سم بوتولیسم می تواند از کارایی دوز دوم جلوگیری کند و این پدیده باعث میشود که تعدادی از بیماران به دوز دوم دارو پاسخ ندهند [۲]. بنابراین چنانچه از اول دوز بالاتری برای درمان این بیماری انتخاب کنیم می توانیم تعداد بیمارانی که نیاز به دوز دوم پیدا می کنند را کاهش داد. در مطالعات محدود انجام شده قبلی افزایش دوز ضمن اینکه بر کارایی دارو میافزاید اما عوارض مهمی ایجاد نکرده است [۲۲٬۲۳] در این مطالعات دوز بالاتر دارو را به بیمارانی دادند که قبلاً دوز کم را دریافت داشته بودند و بیماران را به طور تصادفی به دو گروه دوز کم و زیاد تقسیم نکردهاند [۴،۲۱،۲۶،۲۸] لذا ما در این مطالعه سعی کردیم که بیماران را از ابتدا به صورت تصادفی وارد مطالعه کنیم و به آنها دوز کم و زیاد را بدهیم. همچنین با توجه به مطالعات قبلی که بعضی از بیماران سرانجام با دوز چندین برابر دوز اولیه به درمان پاسخ داده اند، بنابراین ما در این مطالعه دوز متوسطی که بیماران سرانجام به درمان پاسخ دادهاند را به عنوان دوز بالا انتخاب کردیم. بنابراین دوز ۸۰ واحد توکسین را که اغلب بیماران در مطالعات مختلف به آن یاسخ داده اند [۱۱،۲۱،۳۴] را بـه عنــوان دوز کــم و دوز ۲۰۰ واحد توکسین که متوسط دوز مورد نیاز برای بیمارانی که به دوز اولیه پاسخ نداده بودند و نیاز به دوز بالاتر داشتند را، به عنوان دوز بالا انتخاب کردیم [۲۶٬۲۸٬۴٬۲۱]. هدف ما در این مطالعه بررسی تـأثیر افـزایش دوز دارو بـر میـزان بهبـودی و بررسی میزان عوارض ناشی از افزایش دوز بود تا با انجام این مطالعه حداقل دوز مؤثر سم بوتوليسم را در درمان شقاق مشخص كنيم.

روش بررسی

#### نتايج

این مطالعه از نوع تحلیلی و به روش کارآزمایی بالینی میباشد که بر روی ۷۰ بیمار انجام شده است. پزشک معالج در ابتدا تزریق دارو را برای بیمار انجام میداد و سپس پیگیری بیماران توسط همکاران که از میزان داروی تزریق شده اطلاع نداشتند انجام میشد. کلیه بیماران مبتلا به شقاق مقعد که سابقه بیماری بیش از ۳ ماه داشتند، و در معاینه مقعد علایم مزمن شدن به صورت پیدایش skin tag و یا دیده شدن فیبرهای عضله داخلی مقعد در کف زخم، داشتند از اسفند سال ۱۳۷۹ تا تیر سال ۱۳۸۲ در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد وارد مطالعه شدند، بيماران با شقاق حاد، و يا همراه بودن شقاق با فيستول و بيماران با بيماريهاي التهابي روده، سابقه عمل جراحي قبلي و زنان حامله از مطالعه خارج شدند. روش درمان و مكانيسم اثر دارو و عوارض احتمالی آن برای بیماران توضیح داده شد و از همه بیماران رضایت کتبی گرفته شد. انتخاب نمونهها از جامعه مورد بررسی به صورت روش آسان (سرشماری) صورت گرفت و بیماران به روش تصادفی ساده به دو گروه تقسیم شدند: گروه اول (گروه I) یا گروه دوز کم و گروه دوم (گروه II) یا گروه دوز بالا که به ترتیب سم بوتولیسم را به میزان ۸۰ و ۲۰۰ واحد دریافت کردند. سے بوتولیسم (-Dysport-Ipsen Market) با استفاده از سرنگ شماره ۲۷ در حالی که بیمار به پهلوی سمت چپ قرار گرفته بود، بعد از لمس ناودان بین دو اسفنکتر داخلی و خارجی و هدایت سوزن به سمت اسفنکتر داخلی در قدام خط میانی در دو طرف تزریق شد [۲۷]. به بیماران هیچگونه آرام بخش یا بی حسی موضعی طبی تزریق

پاسخ درمانی بعد از یک هفته، دو هفته، چهار هفته و هشت هفته و سپس هر ۳ ماه هشت هفته و سپس هر ۳ ماه یکبار تا یکسال بررسی گردید. بهبودی کامل زخم و یا عدم وجود درد هنگام اجابت مزاج به عنوان پاسخ مناسب درمان قلمداد گردیدند. نتایج با استفاده از نرمافزار Tisherexac و آزمون Fisherexac و مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج با همنی دار فرض شدند.

داده نشد.

۳۸ بیمار مرد و ۳۲ بیمار زن بودند متوسط سنی بیماران ۳۵/۳±۱۱/۲ سال و متوسط طول بیماری ۲۰/۲۹±۴/۱۵ ماه بود و ۸۲/۸۵٪ بیماران شقاق در ناحیه خلفی مقعد داشتند. شایعترین علامت، درد هنگام دفع مدفوع بود. در یک بیمار از گروه با دوز کم و در چهار بیمار از گروه با دوز بالا بی اختیاری مقعد بوجودآمد که در چهار بیمار بی اختیاری مقعد قبل از ۴ هفته، و یک بیماری قبل از ۸ هفته بهبودی کامل یافت و هیچ بیمار عارضه دایمی نداشت. ۶۲ بیمار مطالعه را به پایان رسانیدند و در هر دو گروه ۴ نفر برای پیگیری مراجعه نکردنـ د بعد از یک هفته تنها در گروه دوز بالا (II) ۴ بیمار بهبودی شقاق داشتند و هیچکدام از بیماران گروه دوز کم (I) بهبودی نداشتند (p=٠/١١). بعد از دو هفته ۲۰٪ بیماران گروه یک و  $\Lambda$  بیماران گروه دو بهبودی داشتند ( $p=\cdot/\cdot 1$ ).. دریایان  $\Lambda$ هفتـه ۸۰٪ بیمـاران گـروه یـک و ۹۰/۶٪ بیمـاران گـروه دو بهبودی داشتند (p=0/19).. دو بیمار در گروه با دوز پایین دارو (I) قبل از پایان شش ماه دچار عود سریع شدند ولیکن در گروه دوز بالا (II) هیچ بیماری دچار عود سریع نشد، بنابراین بعد از پایان مطالعه ۲۲ بیمار از گروه دوز کم و ۲۹ بیمار از گروه دوز زیاد بهبودی کامل داشتند ( $p=\cdot/\cdot V$ )..

بعد از پایان مطالعه، ۶ بیمار در گروه دوز کم و ۳ بیمار در گروه دوز زیاد عدم بهبودی داشتند که از این تعداد ۳ ییمار در گروه دوز زیاد در گروه دوز زیاد (گروه II) مبتلا به شقاق مزمن قدامی بودند، بعد از یک سال پیگیری چهار بیمار در گروه یک و دو بیمار در گروه دو عود بیماری داشتند (جداول ۱ و ۲).

جدول ۱: مشخصات و عوارض درمان بیماران مبتلا به شقاق مقعد در دو گروه مورد بررسی

P.Value	(٣۶) II	(٣۴) I	گروهها (تعداد)
100 4140			مشخصات بيماران
٠/٩۵	۳۵/۴±۱۱/۵	<b>Υ</b> Δ/ <b>۲</b> ± <b>1</b> •/ <b>9</b>	متوسط سن ( سال)
·/ <b>Y</b> ٩	17/19	10/19	جنس، مرد / زن( تعداد)
٠/٣۵	\\\\\\±\\\\	۹/۲±۴/۰۷	طول مدت بیماری( ماه)
•/18	4/27	۸/۲۶	محل ضايعه ( خلف /قدام )
_	% <b>\</b> ••	7.1 • •	درد هنگام دفع مدفوع (درصد)
٠/٨	7.41	7.74	خونریزی( درصد)
٠/٩۵	7.18	7.14	درد شبانه( درصد)
_	•	•	عوارض درمان
_	•	•	التهاب محل تزريق
_	•	•	مشكلات عمومى
	۴	١	بی اختیاری گذرای مقعد برای گاز

گروه I تزریق سم بوتولیسم به میزان ۸۰ واحد و گروه I تزیرق سم بوتولیسم به میزان ۲۰۰ واحد انجام شده است. p.Value ، اختلاف بین گروه I و I را نشان می دهد.

جدول ۲: سیر پاسخ به درمان در بیماران مبتلا به شقاق مزمن مقعد در دو گروه مورد بررسی

P.value	گروه II:	گروه I	گروهها
			سیر پاسخ
	۴	۴	عدم مراجعه برای پیگیری
_	•	•	خروج از مطالعه به دلیل عوارض
•/11	(/.17/۵) ۴	•	بهبودی شقاق بعد از ۱ هفته
•/•14	(/.۵٠) 18	(/.٢٠) ۶	بهبودی شقاق بعد از ۲ هفته
-/17	(/.۵٩/٣٧) ١٩	(/.۴٠)۱۲	بهبودی شقاق بعد از ۴ هفته
٠/٢٩	(/.٩٠/۶) ٢٩	(/.٨٠) ۲۴	بهبودی شقاق بعد از ۸ هفته
٠/٠٧۵	(/.٩٠/۶) ٢٩	(/.٧٣/٣) ٢٢	بهبودی شقاق بعد از ۶ ماه
٠/٠٧۵	7.9 • 18	`/. <b>\</b> \\\\\	بهبودی شقاق در پایان مطالعه
	٣	۶	عدم پاسخ به درمان
	•	۲	عود سریع قبل از ۶ ماه
	٢	۴	عود بیماری بعد از ۱۲ماه

p.Value ، اختلاف بین گروه I و II را نشان می دهد.

#### ىحث

افزایش فشار در اسفنکتر آنال عامل عدم بهبودی شقاق مقعد و مزمن شدن آن است [۱۷٬۲۴٬۳۶٬۳۹]. بنابراین درمان در شقاق مزمن مقعد بر روی کاهش فشار اسفنکتر آنال متمرکز شده است. بریدن اسفنکتر عضله داخلی ایک روش ساده و مؤثر در درمان شقاق مزمن مقعد میباشد. و در ۹۰ تــا ٩٥٪ موارد مؤثر است [١۵] عود با این روش بسیار نــادر اســت اما عوارض احتمالی این روش به خصوص بیاختیاری گاز و مدفوع که می تواند برای همیشه پایدار بافی بماند از محبوبیت این روش میکاهد [۱۵]. میزان بیاختیاری اگرچه قبلا تـصور میشد کم است، اما گزارش اخیر حاکی از قابل ملاحظه بودن تعداد موارد بی اختیاری مدفوع است و به طور کلی خطر بی اختیاری در حدود ۱۰٪ می باشد. [۱۲] در یک مطالعه اسفنگترتومي لاترال درمقابل توكسينبوتوليسم بررسي شده است. در این مطالعه ۱۱۱ بیمار در دو گروه مورد بررسی قـرار گرفتهاند در ۴۴٪ از بیماران گروه سم بوتولیسم بهبودی ظرف دو ماه بوجود آمد و ۱۰٪ بیمارانی که بهبود نیافته بودنـد بـا تزریق مجدد دارو بهبود یافتند بنابراین ۷۸٪ بیماران ظرف ۶ ماه بهبود یافتند اگر چه پاسخ سریع درمانی در گروه جراحی سریعتر بوجود آمد اما نتیجه نهایی بعد از شش ماه از درمان در دو گروه یکسان بود. و لیکن در گروه جراحی عوارض دایمی قابل توجهی بوجود آمد [۲۵]. جهت جلوگیری از پیدایش عوارض دایمی ناشی از عمل جراحی، استفاده از درمانهای طبی که بتواند فشار در اسفنکتر مقعد را کاهش دهد، پیشنهاد شده است.

وجود میانجی عصبی اکسید نیتریک (NO) در کاهش فشار مقعد سبب استفاده از داروی نیتروگلیسرین شده است استفاده از داروی نیتروگلیسرین شده است است اما پیدایش عارضه سردرد که در ۶۰-۳۰٪ بیماران شده اتفاق میافتد باعث عدم پذیرش این دارو در بین بیماران شده است. اما اغلب مطالعات اثر بخشی بسیار خوبی از این دارو را در درمان شدقاق میزمن مقعد ثابت کرده است در درمان شدقاق میزمن مقعد ثابت کرده است استفاده از دروهای کلسیمی در اسپاسم اسفنکتر آنال باعث استفاده از داروهای مهارکننده

کانال کلسیم به طور موضعی و یا خوراکی در درمان شقاق مزمن مقعد شده است (۶). در بین داروهای کاهنده فشار اسفنکتر آنال، سم بوتولیسم از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا طریق استفاده آن آسان است و پذیرش بیماران بسیار خوب است همچنین عوارض استفاده از آن بسیار کم میباشد. تنها در یک مطالعه اهمیت برای سم بوتولیسم قائل نشده است [۲۹].ا ما اغلب مطالعات حاکی از تأثیر خوب این دارو در درمان شقاق مزمن مقعد است [۳٬۹٬۳۱].

هنوز بر روی دوز مؤثر سم بوتولیسم مطالعه کافی نشده است. اما شواهد اولیه بر این دلالت دارد که افزایش دوز توکسین می تواند باعث افزایش پاسخ بهبودی در بیماری شقاق مزمن مقعد شود [۴]، اگر چه پیگیری طولانی مدت بیماران حاکی از موارد عود زیادبا این دارو میباشد. اما موارد عود اغلب در بیمارانی اتفاق می افتدکه شقاق ناحیه قدامی دارند که به نظر میرسد فیزیوپاتولوژی پیدایش شقاق در ناحیه قدامی با ناحیه خلفی که شایع ترین نوع شقاق است و به سم بوتولیـسم پاسخ میدهد متفاوت میباشد؛ بنابراین اگر چه موارد عود وجود دارد اما در بسیاری از بیماران مبتلا به شقاق مزمن مقعد در ناحیه خلف، درمان با سم بوتولیسم، با عود همراه نیست [۲۹]. در مطالعه مانیز اغلب بیمارانی که به درمان پاسخ نداده اند چه در گروه دوز کم و چه در گروه دوز زیاد مبتلا به شقاق مزمن قدامی هستند و به نظر میرسد فیزیوپاتولوژی شقاق مزمن قدامی با شقاق مزمن خلفی متفاوت است. اگرچه اظهار نظر دقیق در این خصوص به دلیل تعداد کم بیماران مقدور نمی باشد.

در مطالعات انجام شده قبلی بیماران بعد از عدم پاسخ به دوز اولیه سم بوتولیسم با تزریق دوز مجدد با میزان بیشتر، بهبود یافتهاند، اگر چه دادن دوز دوم همراه با بهبودی بوده است اما به نظر میرسد در تعدادی از بیماران در مقابل دوز دوم سم بوتولیسم مقاومت ایجاد میشود و اثر بخشی آن از بین میرود وگاهی باعث عوارض شدید میشود [۲٬۵٬۲۹] بنابراین به نظر میرسد دادن دوز اولیه کافی در بیماران سبب افزایش بهبودی نهایی بشود در این مطالعه ما دو دوز مختلف

<sup>1 -</sup> Lateral Internal sphincterotomy

<sup>2-</sup> Dysport

میزان عود و عوارض بررسی نمودیم. در مطالعه قبلی نشان دادیم که دوز ۸۰ واحد سم بوتولیسم در درمان بیماران مؤثر است [۱]. با توجه به اینکه دوز ایدهال سم بوتولیسم در درمان شقاق مشخص نمی باشد، هدف ما در این مطالعه بررسی حداقل دوز مؤثر در درمان شقاق است. در اغلب مطالعات دوز توکسین بین ۳۰–۱۵ واحد (Botox) انتخاب شده است و بــا توجه به اینکه هر واحد Botox تقریباً حدود۳-۲/۵ برابر قـوی تر از Dysport است [۳۲] بنابراین در حدود ۹۰-۴۵ واحد Dysport بكار رفته است همچنين مطالعات نشان دادهانـد كـه دوز بالای سم بوتولیسم می تواند در افرادی که به دوز کم سم توكسين بوتوليسم ياسخ ندادهاند بدون افزايش عوارض جانبي خطرناک باعث بهبودی شود [۲۱،۲۸]. لذا در مطالعه حاضر دو دوز ۸۰ و۲۰۰ واحد سم بوتولیسم (Dysport) را با هم مقایسه نمودهایم یعنی دوز را حدود ۲/۵ برابر افزایش دادیم تا اثر افزایش دوز را در بهبود بیماری مشاهده کنیم. نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان داد که این افزایش دوز پاسخ به درمان را در هفته دوم بعد از تزریق در گروه با دوز بالا به طور قابل ملاحظه (معنی دار) افزایش داد به نظر می رسد این اثر مربوط به گسترش دوز بالای سم از عضلات داخلی اسفنکتر به عضلات خارجی و در نتیجه کاهش بیشتری در فشار پایه اسفنكتر آنال مىباشد. مشخص شده است كه افزايش دوز سم باعث یک اثر کلی بر عملکرد تمام عضله اسفنگتر داخلی و تاحدودی اسفنکتر خارجی مقعد میشود. و دوز کم تنها بر فیبرهای نزدیک به محل تزریق مؤثر است [۴] به طوری که در مطالعه ما در بیماران گروه دوز بالا در مقایسه با بیماران گروه دوز پایین عارضه بیاختیاری مقعد بیشتری داشتند بنابراین به نظر میرسد کاهش بیشتر فشار پایه در اسفنکتر داخلی مقعد هنگام استفاده از دوز بالا باعث تـسریع پیـدایش بهبودی و افزایش پاسخدهی نهایی درمان می گردد. پیگیری این بیماران نشان داد که این عارضه دائمی نبوده و همه بیماران بعد از گذشت زمان، بهبودی کامل در عملکرد عضله اسفنگتر داخلی و خارجی پیدا می کنند در بیماران ما بعد از پایان مطالعه ۲۹ بیمار از گروه دوز بالا و ۲۲ بیمارازگروه دوز پایین بهبودی کامل داشتند، لذا به نظر میرسد افزایش دوز

تعداد افرادی که به درمان پاسخ می دهند را افزایش می دهد. مطالعات نشان دادهاند که در بعضی از بیماران که به دوز معمول پاسخ نمی دهند افزایش دوز و استفاده از دوزهای بالا در حدود ۱۵۰ واحد بوتوکس (Botox) و معادل ۵۰۰ واحد بهبودی بیمار می گردد [۴]، اما مشخص کردن اینکه کدام بیمار به چه دوزی از داروی بوتوکس پاسخ می دهد مشکل است و هیچ کدام از یافتههای کلینیکی و مانومتری نمی تواند مشخص کند که کدام بیمار به چه دوزی از دارو نیاز دارد، بنابراین یک دوز متوسط باید مشخص شود و درمان با آن شروع گردد و سپس درصورت عدم پاسخ به سراغ دوز بالاتر دارو برویم.

دو بیمار از گروه یک (دوز کم) عود سریع داشتند یعنی بیماران بعد از بهبودی در پایان هفته هشتم مجدداً دچار عود علایم قبل از شش ماه پس از درمان شدند، چنین مشکلی در بیماران با دوز بالا اتفاق نیفتاد که خود نکته قابل تأملی است همچنین در پایان یک سال بعد ازدرمان شش بیمار در گروه دوز کم (گروه یک) و دو بیمار در گروه دوز بالای دارو (گروه دوز بود) عود داشتند آیا این کاهش میزان عود در بیماران گروه دوز بالای دارو نتیجه افزایش دوز دارو است یا خیر؟

اگر چه در پایان مطالعه اختلاف معنی داری درپاسخ به درمان در دو گروه وجود ندارد اما اگر تعداد بیمارانی که عدم پاسخ به درمان دارند و یا عود سریع و عود بعد از یک سال داشته اند را درهر دو گروه با هم مقایسه کنیم به نظر می رسد، که افزایش دوز داروی بوتولیسم قادر به ایجاد بهبودی بیشتر در بیماران مبتلا به شقاق مزمن مقعد می باشد. از آنجایی که دو گروه مورد مطالعه ما از هر جهت به صورت تصادفی در نظر گرفته شده، لذا با توجه به اینکه P.Value پایان مطالعه به عدد معنی داری نزدیک است. بنابراین احتمالاً مطالعه با تعداد بیشتری از بیماران می تواند کمک کننده باشد. اگر چه میزان عوارض در گروه بادوز بالابیشتر است اما کلیه این عوارض با گذشت زمان برگشت پذیر می باشد و تنها توضیح دادن برای بیماران جهت رفع نگرانی آنها کافی است بنابراین افزایش دوز با عوارض دایمی در درمان شقاق مقعد همراه نیست.

منابع

[۱] سلمانروغنی ح، دبستانی ط: مقایسه بین اثر توکسین بوتولیسم و نیتروگلسیرین موضعی در درمان شقاق مزمن مقعد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ۱۳۸۱، جلد ۹، شماره ۲، صفحات: ۲۱–۱۶.

- [2] Borodic GE, Pearce LB: New concepts in botulinum toxin. *Drug Saf.*, 1994; 11(3): 145-52.
- [3] Brisinda G, Maria G, et al: A comparison of injections of botulinum toxin and topical nitroglycerin ointment for the treatment of chronic anal fissure. *N Eng J Med.*, 1999; 341(2): 65-9.
- [4] Brisnida G, Maria G, Sganga G, et al: Effectiveness of higher dose of botolinum toxin to induce healing in-patient with chronic anal fissure. *Surgery*, 2003; 131(2): 179-84.
- [5] Bhatia KP, Munchau A, Thompson PD, Houser M, Chauhan VS, Hutchinson M, Shapira AH, Marsden CD: Generalised muscular weakness. after botulinum toxim injections for dystoniaiareport of three cases. *J Neurol Neurosurg Psychiatry.*, 1999; 67(1): 90-3.
- [6] Carapeti EA, Kamm MA, Phillips RK: Topical diltiazem and bethanechol decrease anal sphincter pressure and heal anal fissures without side effects. *Dis Colon Rectum.*, 2000; 43(10):1359-62.
- [7] Carapeti EA, Kamm MA, Mc Donald PJ, et al: Randomized controlled trial shows that glyceryl trinitrat heals anal fissures, higher deses are not more effective, and there is a high recurrence rate. Gut., 1999; 44(5): 727-730.
- [8] Curtis D Klaassen: principles of toxipology and treatment of poisoning in GOOD MANS & GILLMANS. Tenth edition. MC GRAW HILL NewYork. chapter 4, pp: 67-80
- [9] Dcui S. Rossi, M Ranfola: Botulinum toxin in the therapy of gastro intestinal disorder. *BMJ*., 2003; 327: 354-355.
- [10] GUID; Rossi S, Runfola M, Magalini S: Botulism toxin in the therapy of gastrointestinal disorder. *Almentary pharmacl & therap.* 2003; 18(1): 1-16.

- [11] Giargio Maria, Cassetta E, et al: A comparison of botulism toxin and slain for the treatment of chronic and fissure. *New. England Med.* 1998, vol. 338 (4): No 4, pp: 217-20.
- [12] Garcia-Aguilar J, Belmonte C, Wong WD, Lowry AC, Modoff RD: Open vs. closed sphincterotomy for chronic anal fissure: long term results. *Dis Colon Rectum.*, 1996; 39(4): 440-3.
- [13] Hambleton P, Cohen HE, Palmer BJ, Melling J: Antitoxins and botulinum toxin treatment. *BMJ.*, 1992; 304(6832): 959-60.
- [14] Hasegawa H, Radley S, Morton DG, et al: Audit of topical glyceryl trinitrate for treatment of fissure-in-ano. *Ann R Coll Surg Engl.*, 2000; 82(1): 27-30.
- [15] Iraj Kodner, Robert D, Fry Jame W, et al: Anal fissures in Schwartz, principle of surgery. 7th ed NewYork McGraw-HILL. 1999. pp: 1298-99.
- [16] Jost WH, Schimringk K. et al: Use of botulinum toxin in anal fissure. *Dis Colon Rectum.*, 1993; 36(10): 974.
- [17] Klosterhalfen B, Vogel P, Rixen H, Mittermayer C: Topography of the inferior rectal artery: a possible cause of chronic, primary anal fissure. *Dis colon Rectum.*, 1989; 32(1): 43-52.
- [18] Lund JN, scholefield JH: Aetiology and treatment of anal fissure. Br J Surg., 1996; 83(10): 1335-44.
- [19] Lysy J, Israelit Y, Zkan Y, et al: Treatment of chronic anal fissure with Isosorbide dinitrate. Long term results and dose determination. *Dis Colon Rectum.* 1998; 41(11): 1406-10.
- [20] Lund JN, scholefieid JH: A randomized, prospective, double-blind, placebo-controlled

- trial of glyceryl trinitrate ointment in treatment of anal fissure. *Lancet*, 1997; 349(9044): 11-14.
- [21] Maria G, Brisinda G, and et al: Botulinum toxin injections in the internal anal sphincter for the treatment of chronic anal fissure: long-term after two different dosage regimens. *Ann Surg* 1998; 228(5); 664-9.
- [22] Madalinski MH, Slawek J: Safety of botulinum toxin therapies. *Dis Colon Rectum.*, 2003; 46(12): 1719-20.
- [23] Madalinski MH, Slawek J, Dnzynski W, et al: Side effect of butolinum injection for benign anal disorders. Eur J Gastroentrol Hepatol., 2002; 14(8): 853-6.
- [24] Miquel M, Belen Heroes, et al: chronic anal fissure. Current treatment option in gastroentrology 2003; 6: 257-262.
- [25] Mentes BB, Irkorucu O, Akin M, et al:
  Comparison of botulinum toxin injection and
  lateral internal sphincterotomy for the
  treatment of chronic anal fissure. *Dis Colon*Rectum., 2003; 46(2): 232-7.
- [26] Madalinsk MH, Slawek J, et al: Topical nitrates and the higher doses of botulinum toxin for chronic anal fissure. Hepaticgastroenter\_ology 2001; 48(40); 977-9.
- [27] Maria G, Brisinda G, et al: Influence of botulinum toxin site injections on healing rate inpatient with chronic anal fissure. Am J Surg., 2000; 179(1): 46-50.
- [28] Minguez M, Melo F, Espi A, et al: Therapeutic effects of different doses of Botulinum toxin in chronic anal fissure *Dis Colon Rectum.*, 1999 Aug; 42(8): 1016-1021.
- [29] Minguez M, Herroros B, Espi A, et al: Longterm follow -up (42 months) of chronic anal

- fissure after healing with botulinum toxin. *Gastroentrology*, 2002; 123(1): 112-7.
- [30] Nelson R: Treatment of anal fissure. *BMJ*., 2003; 327: 354-5.
- [31] Nelson R: A systemic review. Medical therapy for anal fissure. *Dis Colon Rectum.*, 2004, 47 (4): 422 –431.
- [32] Odergren T, Hjultason H, KaKcolas, et al: A Double blind randomaised, Parallel ground study to investigate the dose equivalence of dysport. and Botox in the treatment of cervical dystonia. J Neurol Neurosurgery psychiatry., 1998; 67:6-12.
- [33] Prohm P, Bonner C: Is Manometry essential for surgery of chronic fissure-in-ano? *Dis Colon Rectum.*, 1995; 38(7): 735-738.
- [34] Pasricha PJ ,Ravich WJ , et al: Intrasphincter botulinum toxin for the treatment of achalasia. *N Engl J Med.*. 1995; 332(12): 774-778.
- [35] Robert D, Madoff, James W. Fleshman.AGA technical reviews on the diagnosis and care of patients with anal fissure. *Gastroentrology.*, 2003; 124: 235-245.
- [36] Schouten WR, Briel JW, Auwerda JJ: Relationship between anal pressure and Mucosal Blood flow. *Dis Colon Rectum.*, 1994; 37:664-67.
- [37] Siproudhis L, Sebille V, pigot F, et al: lack of efficacy of botulinum toxin in chronic anal fissure. *Aliment pharmacol Ther.*, 2003; 18(5): 515-24.
- [38] Viyay Shah, Grey lyford, Grey Gores, Gianrico Farragia G: Nitric oxide in gastrointestinal health and diseases. *Gastroentrology*, 2004; 26(3): 903-913.
- [39] Yanek. S. Y. Chiu. Anal fissure in current surgical therapy.7th ed. Missouri. Mosby 2001 P281-283.

## Comparison of the Effects of Two Different Doses of Botulinum Toxin in the Treatment of Chronic Anal Fissure

### H. Salmanroghani MD<sup>1\*</sup>, S. Kargar MD<sup>2</sup>, Z. Butorabi MD<sup>3</sup>

- 1- Assistant Professor, Dept. of Internal Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
- 2- Assistant Professor, Dept. of Surgery,. Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
- 3- Assistant Professor, Dept. of Internal Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

**Background:** Chronic anal fissure is a common disease of the anorectal area. According to manometric studies, the increase of anal sphincter pressure is the most common cause of chronic anal fissure. Therefore, treatment is focused on decreasing the anal sphincter pressure. The injection of botulinum toxin into anal sphincter is one of the treatments, but its ideal dose has not been identified yet.

The aim of the study was to compare the effects of the two different doses of toxin on fissure healing rate, and also assessement of the complication of the treatment.

**Materials and Methods:** 70 patients with history of more than 3 months anal problem, with signs of chronic anal problems, such as skin tag and or visible internal anal sphincter muscle fiber at the base of ulcer were enrolled.

Results: 38 patients were men and 32 patients were women. Mean age was 35.3+11.2 years, and average length of illness was 10.29+4.15 months. The results showed 82.85% of patients had posterior anal fissure. The most common symptom was pain with defecation. In each group, four patients were lost from the study and 62 patients completed the study. One of the patients from the low dose group (I) and 4 patients from the high dose group (II) had gas incontinence. After one week, only 4 patients from the high dose group (II) had recovery, but no patient of the low dose group (I) had recovery. After two weeks, 20% of the patients in group I and 50% of the patients in group (II) had recovery. After 8 weeks, 80% of the patients in the group I and 90.6% of group II had recovery (P=0.29). Two patients in group I had rapid recurrence before six months. There wasn't any rapid recurrence in group II. At the end of the study, 22 patients from group I and 29 patients from group II had complete recovery. Six patients from group I and 3 from group II showed no response to the treatment, and most of them had chronic anterior part fissure. Four patients in group I and 2 patients in group II had recurrence after the one year follow-up.

**Conclusion:** It seems that higher doses of botulinum toxin in-patients with chronic anal fissure increases the treatment response without permanent side effects.

Key words: Chronic anal fissure, Botulism toxin, Anorectal

<sup>\*</sup> Corresponding author Tel: (0351) 8224000 Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences and Health Services, 2004, 3(2): 67-75